

V0  
Zur

Lane Medical Library

# Statistik der Fussgelenkresektionen.

---

## Inaugural-Dissertation

zur

### Erlangung der Doctorwürde

der hohen medicinischen Fakultät

der vereinigten Friedrichs-Universität

**Halle - Wittenberg**

vorgelegt und zugleich mit den beigefügten Thesen  
öffentlich vertheidigt

am 9. August 1872 Vormittags 11 Uhr

von

**Laurenz Lauffs**  
aus Aachen

gegen

F. Held, Dr. med.

A. v. Münster, Dr. med.

---

**Halle,**

Gebauer-Schwetschke'sche Buchdruckerei.

1872.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Seinen Eltern

aus Liebe und Dankbarkeit

und

Seinem Pathen

HERRN LAURENZ THISSEN

aus Freundschaft und Hochachtung

gewidmet

vom

**Verfasser.**

## Literatur.

Die Zahlen, welche bei den betreffenden Chirurgen angegeben sind, beziehen sich auf die numerirten Werke der Literatur.)

---

1. **Brigel.** Ueber Fussgelenkresektionen, Dissertation. Tübingen 1862.
2. **Ried, Frz.** Die Resektion der Knochen mit besonderer Berücksichtigung der von Jaeger gemachten derartigen Operationen. Nürnberg 1847.
3. **Heyfelder, J. F.** Ueber Resektionen und Amputationen. Bonn 1855 s. Brigel l. c.
4. **Wirkert.** Klinischer Bericht über die von 1841 — 1846 von Prof. Günther behandelten Kranken s. Brigel l. c.
5. **Osann.** Ueber die Resektionen des Fussgelenks. Würzburg 1853 s. Brigel l. c.
6. **Heusser, F.** (Hombrechtikon, Canton Zürich). Monatsblatt für medizinische Statistik und öffentliche Gesundheitspflege. Beilage zur deutschen Klinik 1860 10.
7. **Smith.** Medical times and gazette 1858, 19. Decemb. s. Brigel l. c.
8. **Billroth, Th.** Chirurgische Erfahrungen, Zürich 1860 — 1867. s. Langenbeck's Archiv Bd. X, 3. 1869.
9. **Hueter.** Die Resektionen im Königl. chirurg. Klinikum von 1862 — 1865 in Berlin. s. Langenbeck's Archiv Bd. VIII.
10. **Jaesche, G.** in Nishny-Nowgord. Beitrag zur Casuistik der Resektionen. s. Langenbeck's Archiv Bd. VIII.

11. **Wichmann.** Ueber Fussgelenkresektionen, Dissertation. Berlin 1867, s. Virchow und Hirsch II. Jahrg. für 1867. 2.
12. **Stokes, jun. William,** Resektion of the ankle-joint. Dublin quart. Journ. of med. sc. Febr. 1867. s. Virchow und Hirsch. III. Jahrg. 2.
13. **Schoemaker, A. H.** Resektie van het Voetgewicht. Ned. Tydschr. voor Geneesk. Afd. 1. s. Virchow und Hirsch. I. Jahrg. 2,2.
14. **Zernik, Max.** Zehn Fussgelenkresektionen. Dissertation. Berlin 1871.
15. **Uterhardt, C.** Mittheilungen aus der chirurg. Klinik von Hueter. s. Berl. klin. Wochenschrift 1869. S. 472.
16. **Murney, Henry.** On excision of the ankle — joint, being account of the second case in which that operation was performed in Britain. Dublin quart. Journal of med. Februar 1870. p. 97. s. Virchow und Hirsch. 5. Jahrg. II, 2.
17. **Holmes, F.** Note on excision of the ankle-joint. St. George's Hospital, Reports 1870. Vol. IV. p. 239. s. Virchow und Hirsch. 5. Jahrg. II., 2.
18. **Friedrich und Hesselbach.** Beiträge zur Natur und Heilkur der Luxationen. s. Brigel I. c.
19. **Schmidt's** Jahrbücher 1855. s. Brigel I. c.
20. **Sédillot,** Gazette méd. de Paris 1858. s. Brigel I. c.
21. **Doutrelepont,** Casuistik der Luxationen. Berl. klin. Wochenschrift 3. 1866. s. Schmidt's Jahrbücher Bd. 130. S. 1.
22. **Broca.** Reséction tibio-tarsienne traumatique Gaz. des hôpitaux 1867 11. s. Virchow und Hirsch 3. Jahrg. II., 2.
23. **Simon, Gustav.** Mittheilungen aus der chirurg. Klinik des Rostocker Krankenhauses während der Jahre 1861 — 1868. Prag 1868. s. Schmidt's Jahrbücher 140 Bd. 1868.

24. **Neudoerfer** aus dem feldärztlichen Bericht über die Verwundeten in Schleswig. s. Langenbeck's Archiv VI. Bd. S. 559.
25. **Sitzung** der Gesellschaft, für wissenschaftliche Medizin s. Deutsche Klinik 1857.
26. **Velpeau.** Nouveaux éléments des med. opérations Paris 1839. Tome II. s. Brigel l. c.
27. **v. Langenbeck.** Ueber die Schussfrakturen der Gelenke und ihre Behandlung. Rede. Berlin 1868.
28. **Holloway,** Prof. zu Louisville (Americ. med. Journ. N. S. CJ 1866. p. 84.) s. Schmidt's Jahrbücher 132. Bd.
29. **Goldammer,** Bericht über die Thätigkeit des Reserve-Lazareths des Berl. Hilfsvereins in der Garde-Ulanen Kaserne zu Moabit s. Berl. klin. Wochenschrift 1871 Nr. 13.
30. **Socin,** Aug. Kriegschirurgische Erfahrungen, gesammelt 1870 u. 1871 in Carlsruhe. Leipzig 1872.
31. **Zerssen,** Statistik der Amputationen und Resektionen Dissertation Kiel 1868.
32. **v. Gudawski.** Ueber Fussgelenkresektionen Dissertation Greifswald 1869.
33. **Siebert.** Statistik der Resektionen von Hofrath Dr. F. J. Ried ausgeführt. Jena 1868.
34. **Josephson.** De resektione articulationis pedis und Zernial idem Dissertationen Berlin 1867.
35. **Heyfelder,** Osc. Lehrbuch der Resektionen. Wien 1863.
36. **Ollier.** Des résections de grandes articulaires Paris 1871.
37. **Mohs.** Beiträge zu den Resektionen, Dissertation Jena 1866. s. Virchow und Hirsch 2. Jahrg. II. 2.
38. **Sédillot,** C. De l'ablation des malléoles fracturées dans les luxations du pied compliquées de l'issue des os de la jambe au travers de téguments Gaz. méd. de Strasbourg 1867 Nov. Nr. 21. s. Virchow und Hirsch 2. Jahrg. II. 2.
39. **Czerny.** Medicinisch-chirurgische Rundschau 1870 Aug. s. Zernik l. c.
40. **Demel,** Theod. Wiener mediz. Wochenschrift 1861. S. 796.

- 
41. **Gurlt.** Jahresbericht für 1863 — 1865. s. Langenbeck  
Archiv 8 Bd.
42. **Welch.** Compound dislocation of left ankle etc. Med. Times  
and Gaz. 1868 Aug. 8 p. 145. s. Virchow und Hirsch  
III. Jahrg. II., 2.
43. **Schinzinger.** Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen und  
Frakturen. Prager Vierteljahrsschrift XCVII. p. 169. 1868  
s. Schmidt's Jahrbücher 137. Bd. Jahrg. 1868.
44. **Johnson, Zach.** (Kilkenny County Infirmary) Excision of the  
ankle, eventuating in the preservation of the limb with  
movable joint and only slight deformity. Dublin quart. Journal  
of med. etc. 1878 Novb. p. 304. s. Virchow und Hirsch  
5. Jahrg. II., 2.
-

Ogleich die Literatur der zweiten Hälfte des vorigen und der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verschiedene Fälle von Fussgelenkresektionen aufzuweisen hat, so hatte diese Operation sich doch nie einer allgemeinen Aufnahme zu erfreuen, da man auf der einen Seite über dieselbe zu wenig Erfahrung hatte, auf der anderen Seite aber in der Exarticulation nach Syme und Pirogoff Operationen besass, welche bei verhältnissmässig häufiger Erhaltung des Lebens einen guten Stumpf lieferten, und dazu noch bei raschem Heilungsorgange.

Dies gestaltete sich nun wesentlich anders, als B. v. Langenbeck im Schleswig'schen Kriege die überaus guten Erfahrungen über Fussgelenk-Resektionen machte. Es ist von Langenbeck's ungeschmälertes Verdienst, den Fussgelenkresektionen allgemeine Einführung verschafft zu haben; unter den vielen grossen Verdiensten dieses Mannes um die Wissenschaft, wahrlich nicht das kleinste. Da nun noch über Indicationen und Contraindicationen dieser Operation die verschiedenen Chirurgen noch etwas verschiedener Ansicht sind, so schien es nicht unpassend, die veröffentlichten Fälle, soweit uns die Literatur zu Gebote stand, zusammenzustellen, welche insgesamt, über den einen oder den anderen Punkt näheren Aufschluss zu geben, im Stande sein dürften.

# I. Totale Fussgelenkresectionen.

| N <sup>o</sup> | Namen des Chirurgen, und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                      | Operation.                                                                                                       | Ausgang.                       | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen.                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Moreau<br>d. V. <sup>1</sup><br>1792         | Mann<br>19 Jahre.                       | Caries -, ent-<br>standen ein Jahr<br>nach ein. Distor-<br>sion,                              | Tibia u. Fibula<br>wurden 10'' =<br>2,3 CM. rescirt,<br>versch. Theile des<br>Talus mit dem<br>Meissel entfernt. | Heilung.                       | Gehen war im 7. Mo-<br>nat möglich mit Krü-<br>cken, Heilung mit An-<br>kylose erfolgt, Verkür-<br>zung 1'' = 2,7 C.-M.<br>Hinken gering.                                                                                            |                                                                                                         |
| 2              | Moreau<br>d. S. <sup>1</sup><br>1796         | Knabe<br>7 Jahre                        | Caries, des Mal-<br>leolus externus,<br>vergrössert, zwei<br>Fistelöffnungen.<br>Scrophulose. | Tibia 1 1/2'' =<br>4 CM. rescirt,<br>Talus entf. (Lap-<br>penschnitte.)                                          | Heilung.<br>(Miss-<br>erfolg.) | Gehen war nie ohne<br>Stock möglich, sonst<br>Wiederherstellung; die<br>Fibula bog sich, so<br>dass nur der äussere<br>Fussrand den Boden<br>berührte.                                                                               | Die Operation bot be-<br>sondere Schwierigkei-<br>ten wegen Verwach-<br>sung der Tibia m. dem<br>Talus. |
| 3              | Jaeger <sup>2</sup><br>1833                  | Mann.                                   | Caries in Folge<br>einer vor 3 Jah-<br>ren stattgehab-<br>ten Fraktur.                        | Fibula u. Tibia<br>3'' = 8 CM. re-<br>scirt Talus ent-<br>fernt. (?)                                             | Heilung.                       | Beugung u. Streckung<br>normal, leichte Bewe-<br>glichkeit nach den Sei-<br>ten, Neigung des Fusses<br>nach der einen Seite.<br>Fester Stiefel m. einem<br>an der äusseren Seite<br>des Absatzes 6'' = 1,4<br>C.-M. dicken Hufeisen. |                                                                                                         |

|   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | J. K. Heyfelder <sup>3</sup><br>1846. | Mann<br>35 Jahre.                                                  | Caries in Folge einer Distorsion, Umfangreiche Fistelöffnungen, Kräftezustand nicht sehr gut.                                          | CM., mehr v. der Tibia, Talus u. Os naviculare entf.                                                                                                                                                                                                                                          |          | 30. Aug. gem. Anfall. Verfl. günst., nachh. an der Sägeflächen d. Fusswurzelknochen von neu. Caries, Kräfteverfall, 13. Dez. amput. nach 8 Tagen Tod an Pyaemie.                                                                                                                                                  |
| 5 | Günther <sup>4</sup><br>1848.         | Zimmermann<br>von<br>29 Jahren.                                    | Caries, Constitution hektisch.                                                                                                         | Fibula 1'' =<br>2,7 CM.<br>Tibia $3\frac{3}{4}$ '' =<br>2,0 CM.<br>Talus 2''' =<br>0,5 CM.                                                                                                                                                                                                    | Tod.     | Nach der Operation erholte sich Patient, bald selbständige Bewegung des Fusses, die Wunden theilweise geschlossen. 5 Mon. nach der Operation deutliche Zeichen v. Tuberculosis pulmonum. Tod 1 Monat nachh. an Lungenblutg. Knochenflächen waren abgerundet, Talus concav, Tibia convex. Alles mit Eiter unspült. |
| 6 | Textor<br>d. S. <sup>5</sup> 1851.    | Knabe<br>5½ Jahr.                                                  | Caries am Malleolus externus mit drei Fisteln.                                                                                         | Tibia u. Fibula resecirt, Tal. entf. b. d. Operation w. die Achillessehne durchtrennt.                                                                                                                                                                                                        | Heilung. | Gehen mit einem funktionstüchtigen Gliede; die Sohle etwas dicker, um die Ferse eine Lederkappe. Bei der Entlassung völlig funktionstüchtig, keine Deformität, Schuh wie vorher.                                                                                                                                  |
| 7 | Textor<br>d. S.                       | Schuster<br>von<br>23 Jahren.                                      | Caries in Folge einer Distorsion.                                                                                                      | Malleolus extern. resecirt, Talus, Calcaneus u. ein Theil des Os cuboides entf.                                                                                                                                                                                                               | Heilung. | Ein Abscess, welcher sich während der Heilung an der Fusssohle zeigte, wurde eröffnet. Heilung in 8 Monaten.                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | F. Heusser <sup>6</sup><br>1852.      | Stähelin<br>30 Jahre,<br>Bauer aus<br>Wangen,<br>Canton<br>Schwyz. | Caries u. Necrose am unteren Ende d. Tibia, Fibula u. Talus in Folge ein. v. 10 Wochen einwirk. habend. Gewalt. Constitution hektisch. | Unteres Ende d. Tibia, Fibula resecirt, Talus entfernt.<br>* A. merck. Unter Totalen Fussgelenkresektionen wurden nicht nur die Fälle von Resektionen beider Unterschenkelknochen und des Talus, sondern auch diejenigen von Resektionen eines Unterschenkelknochen und des Talus aufgeführt. | Heilung. | Vollkommene Verwachsung zwischen Unterschenkel- u. Fusswurzelknochen.                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter.              | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                | Operation.                                                                                             | Ausgang.                 | Funktionelles Resultat.                                                                                       | Bemerkungen.                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | F. Heusser 1852.                            | Susanne Frei aus Uster, Cant. Zürich, 11 Jahre.      | Caries der Tibia, Fibula und Talus seit 2 Jahren Constitution. scrophul.                                                                | Unteres Ende d. Tibia, Fibula resectirt, Talus entfernt.                                               | Tod.                     |                                                                                                               | Nicht geheilt, daher nachher amputirt, Tod nach 11 Monaten.                                                                                |
| 10  | F. Heusser 1853.                            | Gubelmann, Bauer 46 Jahre aus Dürnten Canton Zürich. | Caries der Tibia, Fibula u. Talus in Folge ein. v. 4 W. Statigef. äussern Veranlass. Durch Bacchanalia und Delirium tremens geschwächt. | Tibia u. Fibula resectirt, Talus entfernt.                                                             | Heilung.                 | Ziemliche Gelenkigkeit.                                                                                       | Dauer 5 Monate. Tetanus u. Delirium tremens wurden durch Bäder und bedeutende Dosen Opium bewungen.                                        |
| 11  | Smith <sup>7</sup> 1855.                    | Gärtner von 26 Jahren.                               | Caries in Folge einer Distorsion, Const. scrophul.                                                                                      | Mit halbmondförmigem Hautschnitt, Fibula und Tibia 2'' = 5,5 CM. und Gelenkfläche des Talus resectirt. | Misserfolg (Amputation). |                                                                                                               | Verlauf Anfangs gut von Jan. bis Mitte Mai, Recidive, Amputation im oberen Drittel des Unter-Schenkels, rasche Heilung, 7. Juni entlassen. |
| 12  | v. Bruns <sup>1</sup> 1861.                 | Kienzle Richard 4 Jahre.                             | Caries seit 7 Monaten, Constitution schwächt.                                                                                           | Fibula 8''' — 1,8 CM., Tibia schräge, innen 5 1/2''' = 1,2 CM. aussen 3''' =                           | Heilung.                 | Gehen möglich, Beweglichkeit d. Gelenks wie die des normalen, Verkürzung 1 CM., vollkommen branchbar, Hinken. | Während d. Verlaufs haben sich von der Schnittfläche 2 kleine Sequester losgestossen. Dauer 5 Monate. Allge-                               |

|    |                                  |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Billroth <sup>8</sup><br>1864.   | Emma<br>L. 19 Jahre.          | Caries des Gelenks mit Fisteln seit 2 Jahren, zugleich Caries des Handgelenks mit Fisteln, wesshalb Exstirpation sämtlicher cariiöser Handwurzelknochen und unteren Endes d. Radius. 10. Aug. 1864. | Unteres Ende d. Tibia resecirt, Exstirpation des Talus.                                                                                           | Tod.     | Nach 6 Monaten mit Fisteln entlassen, 10 Monate nachher Tod an Marasmus. Patientin war bei Beginn des Uebels ein blühendes starkes Mädchen.                                                     |
| 14 | v. Langenbeck <sup>9</sup> 1865. | Mann von<br>26 Jahren.        | Caries d. Sprunggelenks, 15jährige Dauer.                                                                                                                                                           | Resektion beider Malleolen, der unteren Gelenkfläche der Tibia, Exstirpation des Talus.                                                           | Heilung. | Noch in Behandlung aber in gut fortschreitender Consolidation.                                                                                                                                  |
| 15 | Jaesche <sup>10</sup>            | Soldatenfrau<br>v. 33 Jahren. | Caries der Epiphyse der Tibia m. leichter Affection d. Fibula, die erst nach Entfernung der Tibia erkannt wird.                                                                                     | Vorderer Lappenschnitt zur Entfernung der Tibia, äusserer Längsschnitt für die Resektion der Fibula, zuletzt Absägung der Gelenkfläche des Talus. | Tod.     | Anfangs keine auffallenden Erscheinungen, vom 5. Tage zunehmender Kräfteverfall. Tod am 10. Tage, die Tibia unten von Eiter umspült im Markkanal der Fibula bis auf 2'' = 5,5 CM. hinauf Eiter. |

| <i>N</i> | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                    | Operation.                                                                                          | Ausgang. | Functionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.      | Fischer 41.                                 | Maurer von 21 Jahren.                   | Periartikuläre Abszesse mit Theilnähmung des Fussgelenks und Vereiterung desselben; Caries der Tibia, Fibula und des Talus. | Tibia und Fibula subperiostal $1\frac{1}{2}'' = 4$ CM. resecirt und Talus entfernt.                 | Heilung. | Knochenneubildung bedeutend, besonders am Malleolus internus, $1\frac{1}{2}'' = 4$ CM. Umfang mehr als der gesunde Fuss. Der Fuss in unbedeutender Equinusstellung, vollständige Festigkeit fehlt noch, active Beweglichkeit unmöglich; Auftreten und Gehen einiger Schritte mit Hülfe von Kricken. | Während der Heilung Eitersenkung am Fuss; Erysipelas. Dauer der Heilung 2 Monate.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.      | Fischer.                                    | Drechsler von 54 Jahren.                | Fistulöse Caries des Fussgelenks.                                                                                           | Malleolus extern. $\frac{1}{2}'' = 1,3$ CM. Tibia $\frac{3}{4}'' = 2$ CM. resecirt, Talus entfernt. | Tod.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 Wochen lang guter Verlauf, inzwischen Abstossung eines Sequesters von der Sägefläche der Tibia, dann traten profuse Durchfälle, Appetitlosigkeit auf, Patient ging nach wenigen Tagen an acuter Tuberculose zu Grunde. Es zeigten sich sämtliche Organe, auch die Knochen von Tuberkeln durchsetzt. Das Resultat. |

sich abzurunden, von dem Perioste gingen überall callöse Wucherungen aus.

|     |              |                                |                                               |                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|-----|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Fischer.     | Hospitalitin<br>von 45 Jahren. | Caries.                                       | Resektion der<br>Epiphysen der Tibia und Fibula<br>$1\frac{1}{2}'' = 4$ CM.<br>Sustentaculum Tali und Osnavi-<br>culare entfernt.     | Heilung.                   | Exquisite Spitzfussstellung, keine Auftreibung durch Periostwucherung, Fussrücken normal, geringe active Beweglichkeit. An den Resektionswunden noch einige offene Stellen, Fuss bereits ziemlich fest, Patientin mit Hülfe zweier Stöcke ohne alle Schmerzen umhergehend. | Dauer 4 Monate.                                                                                                                      |
| 19. | Stockes jun. | Mann von 27 Jahren.            | Fistulöse Caries.                             | Subperiostale<br>Resektion Tibia<br>$1\frac{1}{4}'' = 0,7$ CM. Fibula $2\frac{1}{2}'' = 6,8$ CM. u. der grösste Theil des Astragalus. | Heilung<br>mit<br>Fisteln. | Patient begann, obwohl noch Fisteln vorhanden, auf Krücken zu gehen, einige Monate später sind die Fisteln geschlossen, öffnen sich aber nach längerer Zeit wieder.                                                                                                        | Am 2. Tage nach der Operation wurde der Gypsverband wasserdicht gemacht, 14 Tage permanentes Bad.<br>Dauer bis zur Heilung 4 Monate. |
| 20. | Schoemaker   | Bauer von 24 Jahren.           | Fistulöse Caries<br>seit $2\frac{1}{2}$ Jahr. | Fibula 6 CM. Tibia $5\frac{1}{2}$ CM. Talus $1\frac{3}{4}$ CM. resecirt.                                                              | Heilung.                   | Active Beweglichkeit, Gehen auf ebenem Boden mit einem Stocke, später auch ohne denselben. Verkürzung 2 Cm.                                                                                                                                                                | Gefensterter Gypsverband, die Heilung wurde durch eine geringe Necrose verzögert. Dauer der Heilung 6 Monate.                        |

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                           | Operation.                                                                                                             | Ausgang.                         | Funktionelles Resultat. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | v. Langen- <sup>14</sup><br>beck 1868.      | Franz Baetge,<br>19 Jahre.              | Vereiterung und<br>Caries, 3 Monate<br>nach einer Dis-<br>tortion. | Resektion des<br>Malleolus extern.<br>Talus entfernt,<br>dessen vordere<br>Gelenkverbin-<br>dung cariös.               | Miss-<br>erfolg.                 |                         | Gypsverband. Die er-<br>sten Tage Eis, dann<br>Pomente. Schöne Granu-<br>lationen, mehrfach<br>Abscesse, Lymphangoi-<br>tis bald, darauf allem<br>Anschein nach Ausdeh-<br>nung der Eiterung auf<br>die Metatarsalgelenke,<br>das Uebel nimmt einen<br>sich verschlimmernden<br>Charakter an, rings um<br>den Fuss tiefe Fistel-<br>gänge, kranker Knochen<br>nicht fühlbar, Wunde<br>frisch, Befinden ausser<br>Anämie zufriedenstel-<br>lend. Amputation vor-<br>geschlagen, nicht be-<br>willigt, P. geht nach<br>Cösen, um dort das<br>Soolbad zu benutzen. |
| 22  | Uter- <sup>15</sup><br>hardt                | Anna Born-<br>hoeft, 28<br>Jahre.       | Fungöse Ge-<br>lenkentzündung,<br>Dauer 1 Jahr.                    | Tibia reseziert<br>1''=2,7, die zer-<br>störte und er-<br>weichte Gelenk-<br>fläche des Talus<br>mit Schabeisen<br>mit | Misserfolg<br>(Amputa-<br>tion). |                         | Nach dem 2. Monat<br>nahm die frühere starke<br>Eiterung ab, Höhle und<br>Wunde schlossen sich<br>bis auf einige Fisteln am<br>inneren Knöchel, im 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Murney<br>1857. | <sup>45</sup><br>Knabe von<br>15 Jahren. | <p>Tumor albus, seit mehreren Jahren bestehend. Bei der Operation zeigte sich die Synovialhaut in brauner fibro-gelatinöser Degeneration, der Knorpel fehlte an einigen Stellen der Gelenkflächen vollständig.</p> <p>Bildung ein. vorderen nach unten convexen Lappens, Strecksehnen und Art. dors. ped. durchschnitten.</p> <p>Resection der Trochlea des Talus und des oberentheils der Gelenkfacetten für die Knöchel, der Rest derselben mit der Knochen-<br/>scheure entfernt; darauf Resection der beid. Malleolen und einer dünnen Schicht der Tibia. Vereinigung durch Suturen.</p> | <p>Heilung.</p> <p>Gehen ist ohne Stock und jegliche Beschwerden möglich. Die Ferse <math>1\frac{1}{4}'' = 3,4</math> Cm. höher als die des gesunden Fusses. Extension ebenso vollständig wie an dem anderen Fusse.</p> | <p>noch nicht aufhören aber einen kräftigen Druck d. Fusses gegen den Unterschenkel ertragen. Nach spät. Nachricht. Bildung von stark eiternd. Fisteln. Allgemeinbefind. schlechter, Amputation in der Mitte der Wade. Heilung in 14 Tagen.</p> <p>In 6 Wochen die Wunde bis auf zwei Fisteln geschlossen; Entlassung des Patienten 9 Wochen nach d. Operation. Nach einig. Mon. Schliessung d. Fisteln. Im 8. Mon. gebrauchte Patient b. Gehen einen Stock, konnte ab. ohne Schmerz. reiten.</p> <p>Nach 11 Jahren Patient kräftig, gesund, geht gerne ohne Stock, er hält sein. operirten Fuss für kräftiger als den gesunden; Gang etwas hindernd, jedoch nicht bedeutender als bei einem schmerzhaften Hühnerauge. Zehen leicht einwärts, Fuss gerade ausgerichtet b. Gehen. Fuss leicht gestreckt, Ferse höher als d. andre, wesshalb ein keilförm. Korkstück in den Stiefel gelegt wird.</p> |
|----|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| N <sup>o</sup> | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter.                       | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                     | Operation.                                                                                                                                                                                 | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                       | Bemerkungen.                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 24             | Holmes <sup>17</sup>                        | Mann von 48 Jahren.                                           | Fistulöse Caries.                                                                                            | Zwei seitliche Incisionen. Resektion der Tibia und Fibula, Ex-<br>traktion d. Talus.                                                                                                       | Heilung. | Gehen mit einem Stock, freie Bewegung der Zehen, etwas passive Beweglichkeit an der Operationsstelle.                                                                         | Lagerung in Assili's Beinlade. Nach 7 Wochen Abscess in der Wade.              |
| 25             | Simon <sup>23</sup>                         | Junges Mädchen von 18 Jahren.                                 | Caries.                                                                                                      | Malleolus intern. mit Gelenkfläche der Tibia u. Kopf d. Calcaneus wurden reseziert, Talus, Osnaviculare u. cuboides wurden exstirpirt. (Zwei bogenförmige Schnitte an beiden Fussrändern.) | Heilung. | Gehen an Stocken möglich. Das Bein 1½ Cm., der Fuss 2 Cm. verkürzt, Wölbung des Fusses vermindert, Zehen beweglich, zwischen Unterschenkel und Calcaneus etwas Beweglichkeit. | Heilung dauerte 11 Monate.                                                     |
| 26             | F. Heusser <sup>6</sup><br>1852.            | Martin Bühler, Bauer aus Weesen, Canton St. Gallen, 41 Jahre. | Necrose der Tibia, Fibula und Talus, entstanden nach einem vernachlässigten Erysipelas. Constitut. hektisch. | Resektion der Tibia und Fibula 7½'' = 20,3 Cm. Exstirpation des Talus.                                                                                                                     | Heilung. | Schönes Resultat, etwas Gelenkigkeit, Verkürzung nur 1½'' = 4 Cm.                                                                                                             | Dauer 11 Wochen. Patient macht in der 16. Woche eine Bergreise von 5000' Höhe. |
| 27             | Weber <sup>18</sup><br>1821.                | Bauer von 42 Jahren.                                          | In Folge einer Distorsion mit Fibulafraktur fistulös.                                                        | Resektion der Tibia 12'' = 2,7 Cm. Entfernen d. Talus.                                                                                                                                     | Heilung. | Leichtes Hinken durch eine Sohle zu besorgen.                                                                                                                                 | Dauer 8 Monate.                                                                |

|    |                    |                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Bumsey<br>1792.    | Mann von 40<br>Jahren.                               | usener Gelenk in die<br>der Sonde.<br>Luxation des lin-<br>ken Fussgelenks.                                                                                          | Resektion der Ti-<br>bia, Fibula und<br>Extraktion der<br>oberen Hälfte des<br>Talus, der bereits<br>fracturirt war.                                                          | Heilung. | Gehen mit Stock, fast<br>normale Beweglichkeit.                                                                                                                                                                                 | Dauer 3 Monate.                                                                                                       |
| 29 | Heusser<br>1854.   | Mann.                                                | Fall und Schlag<br>von einer Leiter.<br>Tibia und Fibula<br>zerschnitten,<br>Tibia vorragend,<br>Weichtheile gan-<br>gränös, Gelenk-<br>fläche des Talus<br>erodirt. | Resektion der Ti-<br>Tibia fast 2'' =<br>5,4Cm., Fibula et-<br>was weniger Ex-<br>traction d. Talus<br>(Schwabe).                                                             | Heilung. | Gehen leicht mit er-<br>höhtem Absatz.                                                                                                                                                                                          | Dauer 6 Monate.                                                                                                       |
| 30 | Sédillot<br>1857.  | Regiments-<br>quartier-<br>meister von<br>27 Jahren. | In Folge eines<br>Sturzes mit dem<br>Pferde Splinter-<br>bruch d. Malleol.<br>internus und des<br>Talus.                                                             | Vorder. Lappen.<br>Primäre Resek-<br>tion der Tibia,<br>ein. entsprechen-<br>den Stücks der Fi-<br>bula 4'' = 10,8<br>Cm. Extraktion<br>des Talus.                            | Heilung. | Ankylose, Verkürzung<br>4 Cm. mit einem pas-<br>senden Schuh, Gehen<br>ohne Stütze. Druck auf<br>die Ferse oder Zehe em-<br>pfindlich, wesshalb die<br>Convexität der Sohle der<br>Concavität des Fusses<br>entsprechen musste. | In 2 Monaten war die<br>Wunde geschlossen,<br>1/2 Monat später Gehen<br>mit inamoviblem Ver-<br>band. Dauer 5 Monate. |
| 31 | Busch (?)<br>1862. | Mann von<br>58 Jahren.                               | Complicirte<br>Luxation.                                                                                                                                             | Zwei Längsschn.<br>Sekundäre sub-<br>periostale Resek-<br>tion der Tibia 2''<br>= 5,4Cm. und der<br>Gelenkfläche des<br>Talus; Entfer-<br>nung der Frag-<br>mente der Fibula. | Heilung. | Ziemlich lang anhalten-<br>des Gehen mit Krücken<br>möglich, nach 2 Jahren<br>geringe Extension und<br>Flexion. Fibula 1 1/2'' =<br>4Cm. breit, Verkürzung<br>1 1/2'' = 4 Cm.                                                   | Nach einem Monat die<br>ersten Gehversuche,<br>Dauer 2 1/2 Monat, dann<br>noch eine Fistel vor-<br>handen.            |

| N <sup>o</sup> . | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                              | Operation.                                                                                                                 | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                        | Bemerkungen.                     |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 32               | Fischer 11                                  | Töpfer von 43 Jahren.                   | Sturz aus einem 3 Stock hoh. Fenster. Verletzung beider Fussgelenke, links bedeutende Zerschmetterung, rechts Frakturen.                                              | Am 30. Tage (sekundäre) Resektion der Epiphyse d. Tibia u. Fibula, Entfernung d. Talus, Calcanei u. Os cuboidei.           | Heilung. | Gehen, auch später in sehr beschränkter Maasse und nur mit Schienens tiel, Massige active Beweglichkeit, leichte Equinusstellung, Fussrück. etw. aufgetrieben. | Dauer 16 Monate.                 |
| 33               | Broca 22                                    | Frau von 33 Jahren.                     | Sprung m. hohen Absätz. aus 1 Wagen, Luxation d. Fusses nach inn., d. Unterschenkelknochen hatten auss. d. Haut u. Stiefel durchh. u. waren in d. Boden eingedrungen. | Extraktion des Talus, Resektion beider Malleolen ohne Erhaltung des zerrissenen Periost.                                   | Heilung. | Gehen mit einem Schienens tiel, Verkürzung beträchtlich geringer als die der resecirten Knochen.                                                               |                                  |
| 34               | v. Langenbeck. 1867.                        | Dindelot Johann, Maurer, 35 Jahre.      | Fall v. ein. Leiter, rechts Fraktur d. Malleol. extern., links ebenso mit Luxat. d. Fusses nach aussen, fast ein Jahr ohne Er-                                        | Resektion des Malleol. extern. d. frakturirte intern. entfernt, Gelenkfläche d. Talus reseccirt. (Gypsverband m. Function) | Heilung. | Fuss normal, wenig verkürzt, reichliche Knochenneubildung, Beweglichkeit möglich, Gehversuche entsprechend.                                                    | Die Reaktion war sehr bedeutend. |

|    |                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35 | v. Langenbeck.<br>1868. | Baunoelt,<br>Mann,<br>23 Jahre. | Fall v. Aste an d. l. Fuss. In d. Geg. d. Malleol. extern. eine 3'' = 8 cm. grosse Hautwunde, durch welche die Tib., Fib. u. e. Stück d. Tal. hervorgetret. waren. Seitenligam. erh., Gelenkkaps. vorn ganz eröffn. Constitut. kräft.                                                                                                                                                                                     | Da d. Fuss nicht twirt war, wird der herausgetretene Theil ganz entfernt, d. vordere Theil war in normaler Verbindung, Spitze des Malleol. extern. reseziert, Fuss reseziert, Fuss reseziert, Fuss reseziert.<br>(Gypsverband.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100. |
| 36 | v. Langenbeck.<br>1870. | Liesigk,<br>Zimmermann.         | Fall 45' h. v. e. Gerüste. Aus Mund u. Nase quillt Blut, besinnungslos, kurz dar. Erbr. e. reichl. Menge v. Bl. Nach u. n. ist es mögl., einz. Mitth. zu erhalten; Schädel-frakt. nicht z. erkennen., l. Arm üb. Process. styloid. gebr. Linke Bursa praepatellaris eröffnet. R. Fussg. eröffnet, Stell. in i. d. Wunde liegt d. Spitz. d. Malleol. extern. weit nach innen eine weisse glänzende Knorpelfläche sichtbar. | Am 7. Tage Malleolus extern. reseziert und Taluskopf extra-hirt.<br>(Gypsverband.)<br>(Watson'sche Schiene.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tod. |
|    |                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Wunden des Knies u. d. Fussg. durch d. Lister'schen Occlusionsverband geschlossen, d. linke Vorderarm u. rechte Unterschenk. in Gypsverband gelegt. Auf d. Kopf e. Eisblase wegen Uebelk. u. Blutbrech, linkerseits wahrscheinlich. traumatische Pleuritis, Adhuktion d. Fusses immer zunehmend, fast rechtwinklig, in d. Wunde Taluskopf sichtbar. — Nach d. Operation treten bald gute Granulationen m. mässlg. Eiterung auf. Hartnäckige Stuhlverstopf., Kopfschmerzen, Delirien, bald Schüttelfröste u. erschöpfende, nicht z. stillende Diarrhoen. Tod a. 15. Tage. Es find. sich e. Schädel-fraktur, beiders. a. Foramen lacrum beginnend, welche d. Pyramide durchzog, üb. d. Keilbein nach d. Stirnb. sich fortsetzte u. in d. Geg. d. Stirnhöckers endete. Kl. Blutextravasate, i. rech. Stirnlapp. ein Abscess v. Haselnussgr. |      |

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter.                            | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution. | Operation.                                                                                                  | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                             | Bemerkungen.    |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 37  | Neudörfer 25                                | Mann.                                                              | Trauma.                                  | Resektion der Tibia, Fibula und des Caput Tali.                                                             | Heilung. | Freie Beweglichkeit des Gelenkes, Verkürzung 1" = 2,7 CM.                                           |                 |
| 38* | Read 26<br>1819.                            | Mann.                                                              | Schussverletzung.                        | Resekt. im untern Drittel d. Fibula, Theil d. Tibia u. 1 Theil d. Talus.                                    | Heilung. | Wahrscheinlich Ankylose, Glied funktionsfähig, Fibula nicht regenerirt, Callus ganz verschmolzen.   |                 |
| 39  | v. Langenbeck 27<br>1864.                   | Werkmeister, Tambour im Kgl. Pr. Leib-Grenadier Regt. Nr. 8. 24 J. | Gewehrschuss aus grosser Nähe.           | Sekundäre subperiostale Resektion beider Malleolen $2\frac{1}{2}'' = 6,8$ CM. u. d. Gelenkfläche des Talus. | Heilung. | Ankylose, Vollständige Regeneration, keine Verkürzung, normale Funktion.                            | Dauer 81 Tage.  |
| 40  | v. Langenbeck 27<br>1864.                   | Graf von Wedell-Jarlsberg, dänisch. Freiwilliger, 38 J.            | Schussfraktur des rechten Fussgelenks.   | Sekund. subper. Resekt. d. Tibia, $3\frac{1}{2}'' = 9,5$ CM. u. d. Gelenkfläche des Talus.                  | Heilung. | Unvollständige Ankylose, Verkürzung $\frac{1}{4}'' = 0,7$ CM., sehr vollkommene Gebrauchsfähigkeit. | Dauer 73 Tage.  |
| 41  | v. Langen-                                  | Groen aus                                                          | Totale Zer-                              | Sekund. subper.                                                                                             | Heilung. | Gehen möglich, Ge-                                                                                  | Dauer 3 Monate. |

Fast ist die Heilung  
vollendet bei Uebergabe  
des Lazareths.

Wie vorher.

Starb nach 1 Monat  
an Gangraen des Fusses  
in Folge schnürenden  
Verbandes u. raschen  
Kräfteverfalls.

Dauert 2 Monate.

Heilung.

Sekund. subper.  
Resektion d. Mal-  
leol. extern. 2''  
— 5,4 CM. u. der  
ob. Gelenkfläche  
des Talus.

Heilung.

Sekund. subper.  
Resektion der Fi-  
bula u. Tibia  $2\frac{1}{4}$ ''  
— 6 CM. u. d. Ge-  
lenkfl. des Talus.

Tod.

Sekund. subper.  
Resektion d. Mal-  
leol. intern., Ex-  
stirpat. d. Talus  
samt d. Kugel.

Heilung.

Sekund. subper.  
Resektion d. Mal-  
leol. intern. 2'' =  
5,4 CM. und der  
oberen Gelenk-  
fläche des Talus.

Rechts Schuss-  
fractur des Mal-  
leol. extern. und  
Talus.

Schussfraktur  
des rechten Fuss-  
gelenks.

Schuss ins rechte  
Fussgelenk, Ku-  
gel im Talus  
steckend.

Schussfraktur  
des rechten Fuss-  
gelenks, Granat-  
schuss.

Thiele vom  
1. Oestr. Inf.  
Regt.

Mich. Wag-  
ner v. Oestr.  
6. Inf. Regt.  
(Coronini).

Bissig, Zug-  
führ. i. Oestr.  
55. Inf. Rgt.  
10. Comp.

Carl Stau-  
dinger 21 J.  
aus Bitterthal  
Pr. Inf. Regt.  
Nr. 31. Com-  
pagn. 10.

v. Langen-  
beck<sup>27</sup>  
1866.

v. Langen-  
beck<sup>27</sup>  
1866.

v. Langen-  
beck<sup>27</sup>  
1866.

v. Langen-  
beck<sup>27</sup>  
1866.

Anmerkung. Obgleich der Fall von Einigen nur als Splitterextraktion betrachtet wird, so haben wir ihn doch mit aufgenom-  
men, selbst auf die Gefahr hin, dass nur Splitter extrahirt (?) worden wären. Jedenfalls ist die Verletzung einer  
Resektion ganz gleich zu stellen.

| N <sup>o</sup> . | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter.        | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                            | Operation.                                                                                                                            | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46               | Holloway <sup>29</sup><br>1864.             | Soldat<br>23 Jahre.                            | Schussfraktur<br>am rechten Fusse.<br>Sehr herunterge-<br>kommen.   | 2 Längsschnitte<br>Sekt. subperiost.<br>Resekt. d. Fibula<br>u. Tibia 1 $\frac{1}{2}$ '' =<br>4 CM. u. d. öbern.<br>Halfte des Talus. | Tod.     |                                                                                                                                                                                                       | Am 3. Tage Haut des<br>Fussrückens brandig;<br>am 4. Tage plötzl. Tod.                                                                                                                                            |
| 47               | Schoenborn <sup>29</sup><br>1870.           | H. Unteroffi-<br>cier d. Gardie-<br>Füsiliere. | Schussrinne des<br>Talus und Bröck-<br>lung d. Gelenks.             | Sekt. Resekt. d.<br>verletztl. Malleol.<br>extern. und Ex-<br>traktion d. Talus.                                                      | Tod.     |                                                                                                                                                                                                       | Bis auf eine internus-<br>culare Zellgewebsver-<br>eiterung an d. vorderen<br>Seite d. Unterschenkel<br>3 Wochenlang günstiger<br>Verlauf, dann Venen-<br>thrombose, Pyämie,<br>Tod, Dauer 1 Monat.               |
| 48               | Socin <sup>30</sup>                         | Cholot,<br>Jean Jerome.                        | Links Splitterung<br>des Gelenkendes<br>der Tibia und des<br>Talus. | Am 26. Tage<br>sekundäre sub-<br>periostale Resekt.<br>d. Tibia u. Fibula<br>4 CM. u. d. Ge-<br>lenkfläche d. Tal.                    | Heilung. | Verkürzung 3 CM.<br>Stellung u. Form nor-<br>mal, beide Knöchel neu-<br>gebildet, Flexion und<br>Extension activ 20°. Nach<br>später. Berichten vollst.<br>Heilung mit guter Ge-<br>brauchsfähigkeit. | 4 Tage nach d. Opera-<br>tion noch Schüttelfröste.<br>Nach 4.5 Wochen lieber-<br>los, 128. Tag d. Wunde<br>noch fistulös, 154. Tag<br>ganz geschlossen bis auf<br>eine. 194. Tag Entlassg.<br>nach Baden - Baden. |
| 49               | Courvoisier <sup>30</sup><br>1871.          | Büeken<br>Hubert.                              | Zersplitterung<br>des Calcaneus<br>und Talus.                       | Am 35. Tage<br>sekt. Res. der<br>Tibia und Fibula<br>4 CM. Entfernung d.<br>Talus, (Suspens.<br>im Gypsverb.)                         | Heilung. |                                                                                                                                                                                                       | Am 70. Tage evacuirt<br>bei gutem localen u. All-<br>gemeinzustand.                                                                                                                                               |
| 50               | v. Langen-                                  | v. Kwicinsky                                   | Schussfraktur d.                                                    | Subperiostale                                                                                                                         | Heilung. | Ankylose, keine Ver-                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | Esmarch <sup>31</sup><br>1866. | Knochenerleug.<br>Verweiterung des Gelenks.                                                                    | Resekt. d. Tibia (Fibula u. Tal.)? Resekt. d. Tibia, Fib. u. Gelenkfl. d. Calcaneus der cariöse Tal. entl. Subperiostale Resekt. d. Tibia, Fibula 1'' = 2,7 CM. u. d. Gelenkfläche des Talus. | Heilung.<br>Heilung. | Geringe Verkürzung geht sehr gut.                                                              | Die Heilung ist sicher zu erwarten.                                                                                                                              |
| 52 | Esmarch <sup>31</sup><br>1868. | Verweiterung des Gelenks. d. Tal. w. carios gefund.                                                            |                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 53 | Hueter <sup>15</sup>           | Eitrige Entzündung in Folge ein. kleinen Verletzg.                                                             |                                                                                                                                                                                               | Heilung.             | Rechtwinkliche Ankylose, Verkürzung sehr gering, nach kurzer Zeit sicherer und gewandter Gang. | Dauer 4 Monate. Die Neubildung d. Malleolen war dicker u. breiter, wie d. Form d. früheren.                                                                      |
| 54 | Hueter <sup>32</sup><br>1869.  | Osteomyelitis m. Durchbruch ins Gelenk.                                                                        | Die Knochen wurden in einzelnen Stücken entfernt (Gefensterter Gypsverband)                                                                                                                   | Heilung.             | Leichte Biegung im Gelenk möglich.                                                             | Wegen bedeutender Eiterung wurden einige Suturen gelöst, lebhaftes Granulations-Knochenneubildg., einz. kleine Abscesse incidirt, Verfl. befriedigend, fast 2 M. |
| 55 | Jaeger <sup>2</sup><br>1830.   | Luxation des Fusses m. doppelter Fraktur d. Fibula im untern Drittel. beständ. Luxation u. Eiterung im Gelenk. | Resekt. d. Fibula 3'' = 8 CM. u. ein abgesprengtes Stück d. Tib., d. unregelmässige Bruchende d. Fibu. m. d. Zange u. einige oberfl. rauhe Stellen d. Tibia u. d. Tal. m. d. Feile geöbnet.   | Heilung.             | Fuss vollk. brauchbar, keine Verunstaltung.                                                    | 4 Wochen nach geschehener Verletzung operirt, Verlauf dauernde 3 Monate.                                                                                         |
| 56 | Ried <sup>33</sup><br>1865.    | In Folge von Polyarthr. rheumat. knöcherne Ankylose des rechten Fusses in Equinastellung.                      | Resektion d. ver- schmolzenen Fib. u. Fibula 5/4'' = 3,4 CM. Entfernen d. Talus Operationsverfahren w. b. Osteotomie.                                                                         | Heilung.             | Ankylose bei normaler Stellung, unbehinderte Gebrauchsfähigkeit.                               | 20 Tage nach d. Operation wurde ein fester Verband m. Fenstern angelegt, d. Eiterg. dauert verhältnissmässig lange Dauer d. Heilung 6 1/2 M.                     |

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                       | Operation.                                                                                                                                                                           | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                      | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | v. Langenbeck 34 1870.                      | Mann, 33 Jahre.                         | Schlecht geheilte Fraktur des Malleol. intern. und Luxation des Fusses nach aussen in Folge eines Falles von einer Leiter. Stellung des Fusses war varus.                                                                                      | Malleol. intern. und Gelenkfläche des Talus resecirt.                                                                                                                                | Heilung. | Geringe Beweglichkeit.                                                                                       | Nach 14 Tagen wegen Hospitalbrand Applikation des Glühseisens schnelle Besserung der Wunden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58  | v. Langenbeck 14 1870.                      | Franz Grundemann, 25 Jahre, Bauer.      | Vor zwei Jahren Distorsion des linken Fusses, ungenügende Behandlung. Abnorme Stellung d. Fusses, durch Gehen noch schlimmer. Vollkommene Varusstellung an der Innenseite des Calcaneus; eine mässig eiternde Fistel ist vorhanden ranher Kno- | Resektion der Tibia und Fibula, letztere mit Talus knöchern verbunden, dieser wieder mit dem Calcaneus, welcher nekrotisch war, so noch Talus und Calcaneus entfernt. (Gypsverband.) | Heilung. | Stellung des Fusses verbessert, Verkürzung 1" = 2,7 Cm. Bewegung möglich, Gehversuche noch nicht angestellt. | Reaktion sehr bedeutend, starke Sekretion der Wunden, desshalb die Suturen entfernt, Hautränder gangränös, Abstossung von Fetzen, an der Tibia mehrere Abscesse mit mässig viel Eiter, alle bis auf den Knochen, also Perionostitis tibiae. Jetzt bedeutendes Erysipel, Reinigung der Wunden, Eiterung mässig. Befinden und Heilung befriedigend. An mehreren Tagen |

sion der Femoralis. Von der Tibia hatsich ein Sequester gelockert, wird extrahirt. Verkleinerung der Wunden, an der Innenseite mässige Höhlung, der nekrotische Knochen ist zu fühlen.

Die Operation war im 8. Monat nach der ersten Verletzung. Am 5. Tage die ersten Suturen entfernt, nachher profuse Eiterung, wuchernde Callusmasse. Nach 14 Tagen Drainage entfernt. Granulationen gut, Fieber gering, Patientin wohl. Wunde fast geschlossen, Gypsverband entfernt, Heilung sicher.

# Heilung.

Subperiostale Resektion der Tibia und Fibula, einer Platte des Talus; d. Fremdkörper wurde gefunden. (Gefensterter Gypsverband, Drainage.)

Fall auf d. linken Fuss, dadurch Fraktur beider Malleolen. Heilung mit Plattenfuss; nach einigen Monaten Bewegungen schmerzhaft, fast constant m. Knarren, Oedem und Schmerzhaftigkeit reichen bis in die Mitte des Unterschenkels. Es wird ein Fremdkörper im Gelenk diagnosticirt.

Dienstmagd.

Hueter 32  
1869.

59

## II. Partielle\* Fussgelenkresectionen.

### a) Resektion beider Unterschenkelknochen.

| N <sup>o</sup> | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Operation.                                                                                                                                 | Ausgang. | Funktionelles Resultat.   | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60             | v. Langenbeck 1870.                         | H. Klappardt<br>Cisleur<br>26 Jahre.   | Patient that im Sept. 1869 einen Fehltr. d. Gelenkwaretw. schmerzhaft, wurde im Debr. bettläger., Anschwellungen am Fusse entleeren Eiter, es wird ein Setaceum am Malleol. extern. gelegt. Bisweilen Fröste im Tage, Nachts Schweisse. Mai 70 aufgenommen, schwächlich, blass aussehend mit phthisischem Habitus. | Cariose Gelenkflächen v. Fibula u. Tibia entfernt. (Geöffneter Gipsverband.) Nach 3 Mon. Amputation im unteren Drittel des Unterschenkels. | Tod.     |                           | Bedeutende Reaktion, langsame Reinigung. Granulationen blass, nicht sehr kräftig. Husten mit reichlichem Auswurf, Kräfteverfall Fortschritte des Lungeneidens, hektisches Fieber, darauf heftige (Os teumyehitis) Tibiae dann Tod unter den Erscheinungen der Pyaemie. |
| 61             | v. Langenbeck 1871.                         | Mädchen<br>19 Jahre.                   | Patientin litt seit 1 1/2 Jahr. a. d. Fusse, ein Quacksalber machte Tibia und Fibula, welche sich                                                                                                                                                                                                                  | Resektion (22 Tage nach der Aufnahme) der Tibia und Fibula, welche sich                                                                    | Heilung. | Funktionfähiges Glied (?) | Drainage nach 4 Wochen entfernt, Heilung fortschreitend, Wunden gut aussehend, Eiterung geringe, Knochenbildung.                                                                                                                                                       |

infektionslängeln. Eine  
des ist zu erwarten.

sion Drainage.)

Aerztl. Behndlg.  
nun auch vergeb.  
Bei d. Aufnahme  
Gelenk stark ge-  
schwollen, deutl.  
Fluktuation. Ge-  
lenkenden v. Ti-  
bia u. Fibula be-  
trächtl. geschwol-  
len, Synovialis  
erhebl. verdickt.  
Keine Schmerzen

Luxation des  
Fusses, Bruch  
beider Unter-  
schenkelknochen

Jaeger<sup>2</sup>  
1831.

Mann  
52 Jahre.

Tod.

Sekund. Resek-  
tion d. Fibia und  
Tibula  $3\frac{1}{4}$ '' =  
8,8 CM. 20. Tag  
nach d. Verletzg.

Tod am 5. Tage nach  
der Operation; es fan-  
den sich die Ligamente  
zwischen Talus u. Cal-  
caneus zerrissen, Eiter  
im Gelenk. Wahrschein-  
lich würde das Resultat  
besser gewesen sein,  
wenn der Talus ent-  
fernt worden wäre.

Jaeger<sup>2</sup>  
1832.

Mann.

Heilung.

Splitterbruch  
beider Knochen.

Sekund. Resek-  
tion d. Tibia  $2\frac{1}{2}$ ''  
= 6,8 CM. der  
Fibula  $4\frac{3}{4}$ '' =  
12,9 CM.

Form d. Gelenks wenig  
verändert, obgl. d. Tibia  
etwas n. hinten abgewi-  
chen war. Beweglichk.,  
Gehen ohne Beschwerd.  
m.  $1\frac{1}{2}$ '' = 4 CM. h. Absatz

Jaeger<sup>2</sup>  
1833.

Frau  
58 Jahre.

Tod.

Complicirter  
Bruch beider Un-  
terschenkelkno-  
chen. Fraktur des  
Collum Humeri.

Tod am 8. Tage nach  
der Operation an Pneu-  
monie, welche durch  
die Verletzung bedingt  
war.

Anmerkung. Unter Partiellen Gelenkresektionen sind hier nur die Resektionen der unteren Enden der Tibia und Fibula  
berücksichtigt, da Resektionen resp. Exstirpationen des Talus von den meisten Chirurgen zu den betreffenden Operationen  
der Fusswurzelknochen gerechnet werden.

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                    | Operation.                                                | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                       | Bemerkungen.                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65  | Jaeger <sup>2</sup><br>1836.                | Mann<br>54 Jahre.                       | Complicirte Luxation mit Bruch beider Unterschenkelknochen. | Resection der Eibula 3'' = 8 CM. der Tibia = 2,7 CM.      | Tod.     |                                                                               | Tod am 18. Tage. Es fanden sich Eitersenkungen zwischen den Muskeln, ausgebreitete Lungentuberkulose in vorgeschrittener Entwicklung.                                                |
| 66  | Küster <sup>2</sup><br>1839.                |                                         | Complic. Fraktur d. beid. Unterschenkelknochen              | Resection der Tibia und Fibula 1 1/2'' = 1,4 CM.          | Heilung. | Vollständ. Gebrauchsfähigkeit.                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 67  | Josse und Codent <sup>35</sup>              | Mädchen<br>16 Jahre.                    | Complicirte Luxation beider Fussgelenke.                    | Links Resection d. Tibia u. Fibula 1 1/2'' = 4 CM.        | Heilung. | Gehen ohne Stock, geringes Hinken, Tanzen, Springen, Lasten tragen, Ankylose. | Dauer 4 Monate (s. Nr. 86 dieser Arbeit.)                                                                                                                                            |
| 68  | Ollier <sup>36</sup>                        | Geburtshelferin auf dem Lande.          | Splitterbruch.                                              | Primäre subperiostale Resection der Tibia u. Fibula 7 Cm. | Heilung. | Geht gut mit einem Stocke.                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| 69  | Ollier <sup>36</sup>                        | Mann.                                   | Fraktur mit 20-30 Fragmenten.                               | Primäre subperiostale Resection 16 Cm.                    | Tod.     |                                                                               | Die Resektion wurde gut ertragen, geringe Reaction, wahrscheinlich geheilt, wenn er nicht in Folge der bei Verletzung erlittenen Schädelcontusion Hirnanschwellungen bekommen hätte. |

|           |    |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 Jahre. | 71 | Ried (?) <sup>37</sup> | Mann<br>27 Jahre. | <p>Luxation, Fluita-<br/>frakturirt, d. Ta-<br/>lus von der Tibia<br/>ganz getrennt,<br/>welche aus der<br/>Wunde am inne-<br/>ren Knöchel her-<br/>vorragt.</p> <p>Complicirte<br/>Luxation, Frak-<br/>tur beider Malleo-<br/>len, Hervorragen<br/>d. Gelenkflächen<br/>v. Tibia u. Fibula.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Prostata-<br/>tion der Tibia 1 1/2<br/>= 2,7 Cm. d. locke-<br/>ren Fragmente d.<br/>Tibia u. Fibula<br/>entfernt. Die<br/>Hauptwunde mit<br/>2 Suturen am<br/>oberen Winkel<br/>vereinigt.</p> <p>Resektion der<br/>Tibia und Fibula<br/>1 1/2 // = 4 Cm.</p> <p>Miss-<br/>erfolg<br/>Aputation<br/>Heilung</p> | <p>zeigen von beginnen-<br/>dem Brand, Eitersen-<br/>kungen d. Sehnschei-<br/>den, Muskel, etc. Bald<br/>darauf schlechtes Aus-<br/>sehen der Wunden, Oe-<br/>dem des Fusses u. Un-<br/>terschenkels, Tagsnach-<br/>her 2 Schüttelfröste und<br/>d. folgenden Tage, Fie-<br/>berzunahme, Amputa-<br/>tion nach 10 Tagen,<br/>Tod an Pyaemie.</p> <p>Entzündung d. ganzen<br/>Fusses, Aputation, bal-<br/>dige Heilung.</p> |
|           | 72 | Sédillot <sup>38</sup> | Junger<br>Mann.   | <p>Fall ein. schwer.<br/>Fasses auf das<br/>rechte Bein. An<br/>d. äusseren Seite<br/>des Fussgelenks<br/>ragen die untern<br/>Enden d. Unter-<br/>schenkelknochen<br/>deren Malleolen<br/>abgerissen,<br/>hervor.</p> <p>Malleol. extern.<br/>extrahirt, einige<br/>Millimeter dicke<br/>Scheibe v. d. Ge-<br/>lenkfläche d. Ti-<br/>bia resecirt. Mal-<br/>leol. intern. bleibt<br/>zurück. Nach 3<br/>Tagen ebenfalls<br/>entfernt, weil er<br/>die Rolle eines<br/>fremden Körpers<br/>spielen könnte.</p> | <p>Heilung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Ankylose.</p> <p>Die Heilung kann als<br/>gesichert betrachtet<br/>werden, dabei wird sich<br/>eine feste Ankylose<br/>bilden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>M</b> | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operation.                                                                                                                          | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen.                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73       | Billroth 39                                 | J. H., Arbeiter, 20 Jahre               | Fall 6 Klaffert tief. Die Sohle des linken Fusses sieht nach aussen, der Fuss ist nach hinten verschoben. Tibia und Fibula durch einen 3'' = 8 Cm. queren Hautriss am inneren Knöchel 3'' = 8 Cm. hervorstech., Malleol. abgebrosch. A. äuss. Fussrand e. dick. Wulst (Bluterguss), d. Haut d. Fusses gut warm, Arteria dorsalis pedis pulsirt, Art. tibial. postic. nichtz. fühl., Blutung unbed. Contusion kräftig. | Primäre subperiostale Resektion 1'' = 2,7 Cm. von der Gelenkfläche angerechnet, der Talus ist unverletzt. (Gypsverband am 2. Tage.) | Heilung. | Active und passive beschränkte Beweglichkeit, Verkürzung $\frac{1}{2}$ '' = 1,4 Cm. Neue Malleolen, Aussehen normal, nur die Narben zeigen die geschehene Operation. Gehen ohne Stock, der Schuh hat eine erhöhte Sohle und seitliche Stützschienen. | Mehrere Abscesse, dadurch die Temperatur erhöht, Eiter entleert. Am 84. Tage die Wunden geschlossen, 88. Tag die ersten Gehversuche, 109. Tag Entlassung. |
| 74       | v. Langenbeck 27 1864.                      | Holke, Kgl. Preuss. Füsilier.           | Ausgedehnte Zerschmetterung beider Malleolen 20 x 3 x 1 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sekund. subperiostale Resektion beider Malleolen 6'' 6 Cm.                                                                          | Tod.     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Giangraen nosocom. u. Septicaemie waren die Todesursache. Tod am 11. T.                                                                                   |

|       |                         |                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1870. | René.                   | Gelenkenden von Tibia und Fibula.                                       | periostale Resektion der Tibia u. Fibula 3 Cm. (Gypsverband nach Volkmann mehrmaliger Wechsel.)                                                             | weglich, Auftreten unsicher wegen zu grosser Beweglichkeit, Fuss etwas nach innen dislocirt. Nach e. Kur in Baden-Baden ist der Gang etw. besser. Gang gut, mögl. m. 2 scill. Schien. | 66. Tag, Evacuation mit schon granulirenden Wunden und bei gut. Allgemeinzustand. Resecirt am 49. Tage.                                                                           |
| 76    | Socin 30<br>1870.       | Grosse Splitterung der Fibula.                                          | Sekund. Resektion der Gelenkenden von Tibia u. Fibula (Suspension in ein. amerikanischen. Drahtschiene, dann Gypsverband mit Lagerungsbrett 2 Mal erneuert. | Fast vollst. Ankylose. Spätere Nachricht, Patient geht ganz gut.                                                                                                                      | 23. Tag Resektion in der 2. Woche starke Jauchung der Operationswunde, Eitersenkungen gegen den Unterschenkel, 3 Incisionen. Fieber bis zum Ende des 2. Monats, Fersendeccubitus. |
| 77    | Massini 30<br>1871.     | Gelenkschuss ohne Ausgangsöffnung.                                      | Sekund. Resektion der Tibia u. Fibula 3 Cm. (Gypsverband mit oberer Holzschiene.)                                                                           | Heilung (?).                                                                                                                                                                          | 66. Tag, Evacuation mit schon granulirenden Wunden und bei gut. Allgemeinzustand. Resecirt am 49. Tage.                                                                           |
| 78    | Courvoisier 30<br>1870. | Zersplitterung des Malleolus extern. und des unteren Theiles der Tibia. | Sekundäre Resektion der Tibia und Fibula 4 Cm., 13 Tage später Amputation des Unterschenkels.                                                               | Tod.                                                                                                                                                                                  | Vor der Resektion jauchige Eiterung m. hohem Fieber, am 17. Tage resecirt, nach der Operation gangrän am ganzen Fusse, Amputation, Tod am 32. Tage an Pyaemic.                    |

| <i>M</i> | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operation.                                                                                                                                                                           | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                           | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.      | v. Langenbeck <sup>14</sup><br>1870.        | Fr. Seefeld,<br>Feldwebel,<br>30 Jahre. | Verw. 16. Aug.<br>a. d. Oberarm<br>(Fleischschuss) u.<br>Fuss. Zerschmet-<br>terung d. Fibula,<br>Austritt d. Kugel<br>in d. planta pedis<br>in der Gegend des<br>Os naviculare.<br>Keine Schmerzen<br>im Fussgelenk.<br>22. Aug. ziemlich<br>hohes Fieber, die<br>Wunde secernirt<br>dünnenichorösen<br>Eiter; nach 2 Tgn.<br>Temperatur 40,4°<br>Schüttelfrost,<br>Verschlechterg.<br>des Aussehens<br>der Wunde. | Secundäre sub-<br>periostale Resec-<br>tion am 15. Tage<br>der fast ganz<br>zersplitterten Fi-<br>bula u. wenig zer-<br>splitterten Tibia<br>10 CM.<br>(Gypsverband m.<br>Schienen.) | Heilung. | Active und passive<br>Beweglichkeit, Verkür-<br>zung 1'' = 2,7 CM.<br>Gehen mit Schnürstie-<br>fel und Seitenschienen<br>ohne Stock vortrefflich. | Fieber sofort 39°, Re-<br>aktion sehr mässig, All-<br>gemeinbefinden zufrü-<br>denstellend, Heilungs-<br>verlauf normal. Nach 12<br>Wochen die Wunden ge-<br>schlossen, Fuss in mäs-<br>siger Abduktion, Gyps-<br>verband in Adduktion<br>angelegt. In Folge des<br>Gebrauchs von Krücken<br>vorübergehende Parese<br>der oberen linken Extre-<br>mität. Entlassen in der<br>28. Woche. |
| 80.      | Schoen-<br>born <sup>15</sup><br>1870.      | Zander,<br>37 Reg.                      | Schussrinne der<br>Tibia hart an der<br>Gelenkfläche mit<br>Eröffnung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sekundäre Re-<br>section am 11.<br>Tage der Tibia<br>und Fibula 1''                                                                                                                  | Tod.     |                                                                                                                                                   | Tod am 68. Tage nach<br>der Operation an Ent-<br>kräftung, die durch lang<br>dauernde Eiterung der                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

gelenks-Entzündung.

### b) Resection eines Unterschenkelknochen.

|     |                                         |                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. | J. F. Heyfelder <sup>35</sup>           | Michael Lakowleff, 14 Jahre.                            | Ein Jahr nach einer Distorsio pedis Caries des Malleolus externus mit Abscess.                                                                         | Malleolus extern. wurde resect.                                                                                                       | Heilung. | Keine lebhaftere Reaction, nach 4 Tagen diphtheritischer Belag (Liquor. haemostaticus Pagliari), dann Heilung mit einer kleinen Oeffnung, auch diese nach mehr. Mon. geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82. | Demel <sup>40</sup><br>Theodor<br>1861. | Timko Batug, Unterkanonier im 5. Artill. Regt. 27 Jahre | Caries der Epiphyse der Tibia, Ursache nicht bekannt. Allgemeinbefinden nur durch ein. leicht. Bronchialcatarrh gestört. Dauer der Affection 9 Monate. | Resektion der Tibia $1\frac{1}{2}'' = 4\text{ CM}$ , Wunde bis auf $1'' = 2,7\text{ CM}$ . genäht, die Höhle mit Charpie ausgestopft. | Heilung. | In der 4. Woche Sehnenabschneidung an der vorderen Seite, der Eiter durch 2 Einstiche entleert, in 10 Tagen geheilt. Von der 5. Woche an passive Bewegungen, i. d. 9. Woche die Höhle fast ganz ausgefüllt. In der 10. Woche Gehversuche mit Schienenstiefeln für Pes equinovarus u. Krücken, in d. 12. Woche Operationen, die wenig Eiter secretiren, geschlossen, die Fistelöffn. schliessen sich ebenfalls, auf Behandlung m. Jodtinctur-injectionen. Dauer 4 M. |

tigen Verletzung abging u. durch andauerndes hohes Fieber herbeigeführt wurde.

| <i>M</i> | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                        | Operation.                                                 | Ausgang. | Funktionelles Resultat. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83       | Osc. Heyfelder 35                           | Leonid Iwanoff, 16 Jahre.               | Fungöses Geschwür, über der stark aufgetriebenen, von Caries ergriffenen Tibia. | Tibia resecirt von 1'' = 2,7 Cm. über der Mitte bis unten. | Tod.     |                         | Anfangs gutes Aussehen, Tendenz zur Heilung nach 1 Monat, schmerzhaftes Auftreibung der Fusswurzel, äussere Wunde brandig, Kräfteverfall, Tod im 2. Monat. Es fand sich Caries ossium tarsi und Entzündung der Fibula.                                                                      |
| 84       | v. Langenbeck 9 1863.                       | Mann, 42 Jahre.                         | Caries Fibulae.                                                                 | Resektion der unteren Hälfte.                              | Tod.     |                         | Todesursache Bronchitis, käsiges Pneumonie.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85       | Fischer 11                                  | Schneider, 64 Jahre.                    | Necrose des Malleolus extern. Constitution schwächlich.                         | Resektion der Fibula 2'' = 5,4 Cm.                         | Tod.     |                         | Fortschritt der Heilung erfreulich, dann Debitas senilis mit unwillkürlichen Entleerungen, Delirien; 2 1/2 Monat nach der Operation Tod. Es fand sich an Stelle des resecirten Knochens ein derbes schwieliges Gewebe mit einigen dünnen unregelmässigen meist längsgestellten, anscheinend |

|    |                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                            |                 |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 87 | King zu<br>Hull <sup>41</sup> | Frau,<br>45 Jahre. | Fussgelenke.<br>Fall, Luxation d.<br>Fusses nach hin-<br>ten mit Fraktur<br>der Fibula im un-<br>teren Viertel,<br>vor 5 Wochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,4 Cm.<br>Resektion des<br>Malleol. intern.<br>Reposition nach<br>subcutaner Tren-<br>nung d. Achilles-<br>sehne möglich,<br>freilich nicht<br>ganz, aber Stel-<br>lung viel besser.<br>Primäre subperi-<br>ostale Resektion<br>der Tibia 12 Cm. | Heilung.                                                                                                 | ringes hinken, lanzen,<br>Spring., Lasten tragen.<br>Einige Beweglichkeit. | Dauer 2 Monate. |
| 88 | Ollier <sup>36</sup>          | Böttcher.          | Bruch der Tibia<br>mit zahlreichen<br>Splintern, wovon<br>einzelne 6—8—<br>10 Cm. gross<br>sind.<br>Complicirte<br>Luxation d. Fuss.<br>nach aussen,<br>Bruch der Fibula,<br>Absprengung<br>d. Malleol. intern.<br>Penetration des<br>unteren Endes d.<br>Tibia durch die<br>Haut. Reposition<br>leicht, dann hef-<br>tige Entzündung<br>d. Beines, Blasen-<br>bildung, Eiter-<br>senkungen, Jan-<br>chung d. Wunde,<br>Knochen schiebt<br>sich wieder vor. | Heilung.                                                                                                                                                                                                                                          | Unvollständige Rege-<br>neration, also Miss-<br>folg.                                                    |                                                                            |                 |
| 89 | Welch <sup>42</sup>           |                    | Sekundäre Re-<br>sektion am 12.<br>Tage des unteren<br>Endes der Tibia<br>1½" = 4 Cm.<br>Malleol. intern.<br>wird zurückge-<br>lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heilung.                                                                                                                                                                                                                                          | Sehr bewegliches und<br>mit der Zeit fast ganz<br>die frühere Kraft wie-<br>der gewinnendes Ge-<br>lenk. |                                                                            | Dauer 2 Monate. |

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Operation.                                                                                                                                                                                            | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                  | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | Schin-<br>ziuger <sup>43</sup>              | Mann,<br>50 Jahre.                      | Complicirte<br>Luxation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Primäre Resek-<br>tion, Tibia sub-<br>periostal 7 Cm.                                                                                                                                                 | Heilung. | Stellung normal,<br>geringe Beweglichkeit,<br>Verkürzung 6 Cm. Pa-<br>tient geht mit erhöhtem<br>Absatz ohne Stock.                      | Nach 3 Wochen ein<br>nekrotisches Stück der<br>zerbrochenen Fibula ex-<br>trahirt. Patient verlässt<br>vor seiner Heilung das<br>Spital. Nach 10 Mona-<br>ten alles geschlossen.                                                                                                                                                                                                                          |
| 91  | Johnson,<br>Zach. <sup>44</sup>             | Landmann.                               | Complicirte Frak-<br>tur und Luxation.<br>Fall von einem En-<br>fenschober auf<br>einen Steinhan-<br>fen. Fibula $1\frac{1}{2}$ "<br>= 4 Cm. über dem<br>äussern Knöchel<br>abgebrochen, Ti-<br>bia durch einen<br>grossen Riss an<br>der Innenseite<br>getrieben, der<br>Fuss unter einem<br>Winkel von 45<br>Grad a. d. Aussen-<br>seite aufwärts<br>gedrängt. | Da die Ampu-<br>tation verweigert<br>wird, Resektion<br>des unteren En-<br>des der Tibia, Re-<br>position, die<br>Sägefläche ruht<br>auf der Gelenk-<br>fläche des Talus.<br>(Seitliche<br>Schienen.) | Heilung. | Bewegliches, sehr we-<br>nig deformes Gelenk.<br>In der ersten Zeit war<br>Patient gezwungen, sich<br>noch eines Stockes zu<br>bedienen. | Gangränöse Ab-<br>stossung der zerisse-<br>nen und zerquetschten<br>Haut, Portionen der zer-<br>rissenen Ligamente und<br>Sehnen und nach Besei-<br>tigung der Anfangs sehr<br>übelriechenden und pro-<br>fusen Eiterung durch<br>Carbolwasser, füllte sich<br>die grosse Wunde mit<br>Granulationen u. schloss<br>sich allmählig, so dass<br>Patient nach 8 Monaten<br>das Hospital verlassen<br>konnte. |

|    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                    |          |                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | v. Langen-<br>beck <sup>27</sup><br>1866. | theol.)<br>Dänischer<br>Freiwilliger.                                | Verletzung des unteren Endes der Tibia und Fraktur der Fibula 29 Jun.                                                                  | Verletzung des unteren Endes der Tibia und Fraktur der Fibula 29 Jun.              | Heilung. | Keine Verkürzung, sehr vollkommene Regeneration des Malleolus.                                        | Dauer 3 Monate.                                                                                                                  |
| 94 | v. Langen-<br>beck <sup>14</sup><br>1870. | Dombrowsky,<br>24 Jahre,<br>45. Infr.-<br>Regiment.                  | Zerschmetterung des linken Fussgelenks durch Granatschuss m. ausgedehnter Zerreissung der Haut.                                        | Sekund. subperiostale Resektion des Malleolus internus $2\frac{3}{4}$ '' = 7,5 Cm. | Heilung. | Der Fuss stand bei ankylotischem Gelenk nach einwärts. Weitere Operation verweigert, also Misserfolg. | Kein Gypsverband wegen starker Infiltration der Weichtheile. In den folgenden Wochen Knochensplinter entfernt, langsame Heilung. |
| 95 | Wilms <sup>25</sup>                       | Mann,<br>58 Jahre.                                                   | Verwundet 31. Aug. Eingangsöffnung oberhalb des Malleol. internus hinter und unter Malleol. extern. wurde die Kugel herausgeschnitten. | 6 Wochen nach geschehener Verletzung unteres Ende der Tibia resect.                | Tod.     |                                                                                                       | Tod am 6. Tage an Erysipelas traumatic.                                                                                          |
| 96 | F. Heusser <sup>6</sup><br>1848.          | Frau<br>Weininger<br>aus Jona,<br>Canton<br>St. Gallen,<br>66 Jahre. | Verletzung des unteren Endes der Fibula seit 12 Jahren.                                                                                | Interes. Ende der Fibula $7\frac{1}{2}$ '' = 20,3 Cm. resect.                      | Heilung. |                                                                                                       | Dauer 12 Wochen.                                                                                                                 |

# III. Acht\* Fussgelenkresectionen von Herrn Prof. R. Volkmann.

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, (Geschlecht, Alter.                     | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Operation.                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerkungen.                                                                                |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | Volkmann 1866                               | Rochhart, Ober-Lieutenant im k. k. österr. 1. Infanter.-Reg. | Schussfraktur des linken Unterschenkels mit Splitterung in's Sprunggelenk bei Frauenau am 27. Mai 1866. Die Kugel war 2'' = 5,4 Cm. über der Spitz d. Malleol. intern. einge- drungen, hatte die Tibia in eine sehr grosse Zahl von Fragmenten zerschlagen und ausserdem noch die untere Epiphyse durch eine insagittaler Richtung verlaufende Spalte in eine äussere u. innere Hälfte getheilt (sogenannter T | Resektion den 16. Aug. sekundär u. subperiostal von Tibia und Fibula incl. der Splitter 3 1/2'' — 1'' = 4 Cm. Gelenkfläche des Talus ebenfalls resecirt. Die Operation wurde mit einem einzigen Längsschnitt üb. dem Malleol. extern. ausgeführt. (Gypsschwebe.) | Heilung  | Fuss Anfangs sehr schwach, hat sich noch bis in die letzte Zeit fortwährend gekräftigt. Verkürzung 1 1/2'' = 3,8 CM. Die Form des Fusses ist normal, active Beweglichkeit ist vorhanden und beträgt die Flexion und Extension 20°. Gang sehr gut, Patient ist Stundlang auf d. Beinen, benutzt beim Ausgehen meist einen Stock, im Zimmer aber geht er stets ohne Stock. | Heilungsvorgang war, ein sehr langsamer, Dauer ein Jahr. Nach der Operation keine Reaktion. |

| 98 | Volkmann<br>1869. | Wilhelm<br>Becker<br>34 Jahre<br>Maurer aus<br>Etzoldsheim | Fibula zertrüm-<br>mert, war jedoch<br>stecken geblie-<br>ben. Reaktion<br>sehr erheblich.<br>sehr bedeutende<br>Jauchung von pe-<br>netrantem Ge-<br>ruch, Eitersen-<br>kungen am Mall.<br>extern. Grosser<br>Fersendekubitus<br>Am 30. Juli Insi-<br>cion am Malleol.<br>extern.. Extrak-<br>tion der Kugel<br>u. einer grossen<br>Zahl von Kno-<br>chensplittern. | Subperiostale<br>Resektion der<br>Fibula 1','' = 4<br>CM. ebensoviel<br>von der Tibia u.<br>eine starke Schei-<br>be von der Ge-<br>lenkfläche, Tal.<br>Gypsverband m.<br>Eisenschiene,<br>Supension. | Heilung | Starke Knochenbil-<br>dung, Verkürzung 1''<br>= 2,7 CM. Gelenk sehr<br>fest, ohne seitliche Be-<br>wegung. Dorsal und<br>Plantarflexion fast nor-<br>mal. Gehen zuerst m.<br>Krücken, Auftreten<br>ohne Schmerzen, Pa-<br>tient lernte sehr bald<br>mit einem Schienen- | Bedeutende Reaktion,<br>starke Schwellung,<br>tätiges Fieber, wel-<br>ches bald nachliess.<br>Am 9. Tage Schüttel-<br>frost, erneutes Fieber,<br>starker Schmerz,<br>Schwellung der vom<br>Verband freigelassenen<br>Theile. Nach 2 Tagen<br>Nachlass des Fiebers, |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Leider konnten wir nur einen kleinen Theil der von Herrn Prof. Volkmann ausgeführten Resektionen benutzen, da von den meisten das funktionelle Resultat nicht bekannt und in der kurzen Zeit zu erfahren unmöglich war, während einige sich noch in Behandlung befinden.

| Namen des<br>Chirurgen<br>und Jahr der<br>Operation. | Namen der<br>Operirten.<br>Geschlecht,<br>Alter. | Krankheit,<br>Ursache, Dauer,<br>(Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Operation. | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M <sup>2</sup>                                       |                                                  | kräftiger, wohl<br>genährt, gesund<br>ausschender<br>Mann. Die Unter-<br>suchung ergab<br>vollständige Zer-<br>reissung der<br>Weichtheile und<br>Ligamente an<br>d. inneren Seite,<br>Fraktur d. Fib.,<br>Hervorstehen der<br>ebenfalls fraktu-<br>rirten Tibia. Eine<br>bedeutende Blu-<br>tung rührte von<br>einer Verletzung<br>der Tibialis pos-<br>tica her. Unvoll-<br>ständige Reposi-<br>tion, Schiene an<br>d. äusseren Seite<br>6 Tage streng an-<br>tiphlogistische<br>Behandlung.<br>trotzdem starke<br>Schwellung der |            |          | Stiefel ohne Stock zu<br>gehen. Nach späteren<br>Nachrichten ist die Ge-<br>brauchsfähigkeit des<br>Fusses eine normale,<br>Patient versieht seine<br>Arbeit als Maurer wie-<br>der und ist im Stande<br>weitere Märsche z. machen | subjektives Wohlgefühl;<br>In der dritten Woche<br>Abscesse auf dem Fuss-<br>rücken und an der vor-<br>deren Seite des Unter-<br>schenkels. In der 5.<br>Woche entleerten sich<br>mit dem Eiter aus bei-<br>den Operationswunden<br>kl. Knochenstückchen.<br>Gute Granulationen,<br>Fortschreiten der Kno-<br>chenneubildung, zumal<br>an der inneren Seite.<br>In der 8. Woche wurde<br>der Gypsverband er-<br>neuert, der in Folge<br>der Abschwellung sehr<br>locker geworden war.<br>Die Hacke wurde mit<br>in den Verband einge-<br>schlossen, da der De-<br>kubitus inzwischen ge-<br>heilt war. 20. Septem-<br>ber Allgemeinbefinden<br>vorzüglich, guter Er-<br>nährungszustand, Ope-<br>rationen sind bis |

nulationen, in d. ihere noch an zwei Stellen kleine Knochensplitter zu fühlen. Am 31. Oct. die ersten Gehversuche.

Die Reaktion, welche auf die Resektion folgte, war eine sehr geringe.

zur vollständigen Gelenkverheilung bestehen blieb. Da Verheilung durch Caries des Malleol. intern. und einen thaler-grossen Dekubitus an der Hacke ferner durch Kräfteverfall eintrat, wurde am 9. Juni die Resektion gemacht.

Nach einem kalten Bade im Juli 1869 heftige Schmerzen am Malleol. intern. d. linken Fusses. Baldige Anschwellung der Weichtheile, hohes Fieber. Nach 4 Wochen Fluktuation, Incision; mit der Sonde bloss liegender Knochen zu fühlen, der behandelnde Arzt wollte die Lösung des vermeindlichen Sequester abwarten

Karl Kerstan  
22 Jahre  
Glaser aus  
Weissenfels.

Volkmann  
1870.

Heilung.

Eine Entfernung der schlechten Granulationen u. kleinerer nekrotischer Knochenstücke aus d. Cloake d. 11. Mai mit scharfen Löffeln nicht ausreichend, deshalb bei vermehrten Schmerzen, bedeutender Schwellung des Fussgelenks u. reichlicher Sekretion eines dünnen, d. eiternden Gelenken eigenthümlich. Eiters

In der 6. Woche nach der Operation wurde Patient mit einem gewöhnlichen gefenster-ten Gypsverband bei guter Vernarbung der Wunden entlass. Nachdem er mehrere Monate den Gypsverband getragen, wurde er abgenommen und kein neuer angelegt, für die noch nicht geheilten Wunden wurden Salben verordnet. Am 12. Apr. wieder aufgenommen, der Fuss in Equinusstellung, Patient kann die Sohle nicht auf die Erde bringen, Regeneration der Knochen sehr bedeutend, Beweg-

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Operation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgang, Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bemerkungen. |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |                                             |                                         | <p>doch liess sich keine Beweglichkeit je constatiren, eine trotzdem vorgeschlagene Operation wurde verweigert. Etwa Anfangs April 1870 wird d. Ausfluss überreichend, stärkeres Fieber, Kräfteabnahme darauf Aufnahme in die Klinik</p> <p>6. Mai. Patient 1 blasser heruntergekommen aber noch leidl. genährter Mensch. Temperatur erhöht 1<sup>11</sup>/<sub>4</sub> oberhalb d. Spitze d. Malleol. intern.</p> <p>1 geschwürige, v. missfarbigen, schlechten Gra-</p> | <p>(Resektion d. 21. Mai) Subperiostale 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'' = 4 Cm. Fibula entfernt ebensoviel v. der Tibia. Tibia war ausserordentlich rarefiziert u. blutreich, jedoch wurde im Gesunden reseziert, Gelenkfläche des Talus ebenf. entfernt. Vereinigung der Incisionswinkel durch die Naht, Drainage der Wundhöhle, Gypsverband m. Dorsalschiene, Suspension.</p> | <p>lichkeit im Gelenk verhältnissmässig giebig, an beiden Seiten des Gelenks 2 m. schwammige Granulationen ausgefüllte Fistelöffnungen, die quer mit einander verbunden sind, blossliegender Knochen fühlbar. Für die Equinusstellung wird eine passende bewegl. Maschine verordnet, die Fisteeln mit Löffeln ausgekratzt.</p> <p>19. Mai 1871 Auftreten mit der ganzen Sohle möglich, doch hat der Fuss noch Neigung zur Equinusstellung nach Entfernung der Maschine, die Fisteeln zeigen Neigung zur Heilung Arg. nitr. Lösung zu Einspritzungen verordnet, nach einigen Tagen wieder entlassen.</p> <p>21. Juni Stellung des</p> |              |

|     |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | Volkmann<br>1870. | M. S. aus M.<br>Mädchen<br>von 15 Jahren. | <p>Caries d. rechten Malleol. extern. seit 1 Jahre, plötzlich. Durchbruch ins Gelenk, acut. Vereiterung. (Hereditäre Syphilis [?]).</p> <p>14 Tage nachher am 16. Mai subperiostale Resektion der Tibia u. Fibula <math>1\frac{1}{2}''</math> == 4Cm., Abkratzung. des Talus.</p> <p>Heilung.</p> | <p>Zeit, eistem noch nicht ganz geschlossen, mit Granulationen wieder ausgefüllt, nochmals m. scharfen Löffeln ausgekratzt, zu Injektionen d. Villat'sche Lösung verordnet. 15. Nov. 71. Patient geht mit gewöhnl. Stiefel, dessen Hacke etwas erhöht ist, recht gut ohne Stock; der operirte Fuss hat eine Neigung zur Valgusstellung, Verkürzung 4 Cm. Die Knochenneubildung ist eine recht befriedigende, die Funktionsfähigkeit, die Beweglichkeit ist eine recht gute, die Streckung ist normal, d. Dorsalflexion mehr als bis zu 1 R. möglich. Seitliche Beweglichkeit gering Patient erhält 1 Stiefel mit federnder innerer Schiene, etwas dickerer Sohle, besonders nach der Innenseite.</p> <p>Vorzügliches Resultat, Gelenk sehr fest und kräftig, active Beweglichkeit. Plantarflexion bis ein wenig über 1 R möglich, Dorsalflexion bis z. normalen Grenze.</p> | <p>Heilungsdauer 4 Monate; Patientin wurde in ihrem 14. Jahre von Heimpflege d. ganzen linken Seite befallen u. ist der linke Fuss fast noch ganz gelähmt; trotzdem</p> |
|-----|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| N <sup>o</sup> | Namen des Chirurgen, und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Geschlecht, Alter. | Krankheit, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Operation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101            | Volkmann 1871.                               | August Donath aus Cöthen 49 Jahre.      | Fall am 31. Oct. 1870 von einer Leiter in Folge dessen complizirte Luxation d. linken Fusses, Fraktur d. Tibia und Fibula, die Sohle stand nach aussen. Die Tibia war sögebrochen dass der laterale Theil desselben vom Ligament interosseum etc. gehalten in Form einer kurzen Pyramide, deren Basis an der Gelenkfläche war, abriss und stehen blieb, während d. Mal- | Nach bloss gelegter Fibula zeigt sich eine Frakturstelle 3—4 CM. über d. Spitze des Malleol. extern. Es ist ein Splinterbruch mit drei bis vier langen dünnen Splintern gewesen. Callusbildung, leichte Dislocation mit Winkelbildung nach der Tibia. Beim Durchsägen mit der Stichsäge löst sich die alte Fraktur, wodurch die Ope- | Heilung. | Verkürzung ist nicht vorhanden. Tibia vollständig regenerirt, Fibula weniger.<br><br>11 bis 12 Wochen nach der Operation die ersten Gehversuche, Patient lernt mit Stock u. Schienenstiefel sehr bald u. recht gut gehen. Nach einem halben Jahre geht Patient gut ohne Stock. Umfang in der Malleolgegend 27 CM. am gesunden Fuss 24 CM. Verkürzung $\frac{3}{4}$ l' = 2 CM. Der Fuss hat eine geringe Neigung sich in Valgusstellung zu beugen und trägt Patient deshalb den Schienenstiefel fort. Gelenk activ beweglich, Streckung normal, Beugung etwas weniger. Passiv im Fussgelenk etwas seitliche Bewegungen; Pa- | Patientin sich nur auf dem resecirten Fuss stützen kann, ist sie von früh bis Abends auf den Beinen.<br><br>Nach der Operation geringe Reaction, Relativ rasche Heilung, nach 6 Wochen Incisionswunden und Fisteln vollständig u. definitiv geschlossen. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>weitausd. wunde hervortragte. Re-position: Hautwunde genäht, gefenst. Gypsb. Nach 8 Tagen wegen starker Schwellung abgenommen, der Fuss in ein Posch-sches Fussbett gelegt, Jauchung sehr stark, Eiter-senkungen u. Fi-steln weit am Un-terschenkel hin-auf. Fieber sehr hoch. Eiterung lässt allmählig et-was nach, Patient fängt an sich etwas zu erholen, d. Zustand lange Zeit unverändert, Fisteinschlüssen sich nicht, und eiteren ziemlich stark fort, Allge-meinzustand konnte sich nicht erhebl. bessern.</p> <p>Am 6. Apr. 1871 Patient sehr her-unter, Abends mässige Febricula, der verletzte</p> | <p>Dann Längs-schnitt über den Malleol. intern. Nach Ablösung des Periost und Eindringen eines Fingers ins Ge-lenk, findet sich zwischen Ti-bia und Fibula ein Knochenkeil, in der Kranken-geschichte als Pyramide be-zeichnet, voll-ständig nekro-tisch nirgends m. Weichtheilen in Verbindung. Es wird nun noch das Ende der Tibia abgesägt, diese wie Fibula <math>1\frac{3}{4}'' = 4,7</math> CM. Gypsverband m. vorderer Eisen-schiene, Suspen-sion.</p> | <p>Verkürzung dieselbe, Dorsalflexion ein wenig über einen R. möglich. Die Wade ein wenig schwächer als die der gesunden Seite. Gehen ohne Hinken mit Stock eine Stunde weit, ge-wöhnlich ohne Stock. Die Funktion hat sich in der letzten Zeit noch wesentlich gebessert. Regeneration der Tibia sehr schön, grosser, breiter Malleol. tiefal herabreichend, Malleol. extern. weniger gut regenerirt.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Namen des<br>Chirurgen,<br>und Jahr der<br>Operation. | Namen der<br>Operirten,<br>Geschlecht,<br>Alter. | Krankheit,<br>Ursache, Dauer,<br>Constitution.                                                                                                                                                                                                                            | Operation.                                                                                                                                                                 | Ausgang. | Funktionelles Resultat. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102                                                   | Volkmann<br>1871                                 | Fuss stark ödematös, die ganze Fussgelenkgegend schwartig aufgetrieben, leichte Valgustellung. Der Abstand beider Knöchel erheblich vermehrt. In der Umgebung des Malleol. intern. versch. dünnen Eiter entleerend. Fist. d. ins Fussgelenk u. auf bloss. Knochen führen. | 2. Aug. Fibula u. Tibia $1\frac{1}{2}'' = 4$ Cm. subperiostal resecir. Tabus entfernt, ebenso Theile des Calcaneus und Os naviculare. Die Resection fand in der Grenze des | Tod.     |                         | In der ersten Zeit günstiger Verlauf am 10. August Recidive u. weiteres Umsichgreifen der Caries constatirt, deshalb Amputation am Orte der Wahl 15 August. Bei heftigem Brechen und Würgen nach einigen Stunden neues Nachbluten. |

|                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volkmann<br>1871. | Kurt<br>v. Krosigk<br>Premier-<br>Lieutenant<br>z. D.<br>38 Jahre. | Sturz aus einem<br>Fenster d. ersten<br>Stocks, schwere<br>Zerschmettrung<br>des Unterschen-<br>kels, sehr schrä-<br>ger complizirter<br>Bruch des untern<br>Drittels d. Tibia,<br>der ins Gelenk<br>perforirte. Der<br>Talus war in eine<br>grössere Anzahl<br>kleinerer Stücke<br>zersplittert. Ver- | Am 2 Nov. sub-<br>periost. Resek-<br>tion der Fibula 1 1/2''<br>= 2,7 Cm., die mit<br>d. Talus knöchern<br>verbundene Tibia<br>war in grosser<br>Ausdehnung mit<br>d. Haut verwach-<br>sen, die Verbin-<br>dung zwischen<br>Tibia und Talus<br>wurde mit dem<br>Meissel getrennt<br>und die Tibia 1 1/2'' | Heilung:† | Nach Entfernung des<br>Verbandes active Be-<br>weglichkeit, passive<br>bedeutender, grosse<br>Festigkeit nach der seit-<br>lichen Richtung, täg-<br>lich passive Bewe-<br>gungen, Nachts Lage-<br>rung in einer Blech-<br>schiene auch zuweilen<br>im Tage, Anfangs Fe-<br>bruar 72, Stiefel mit 2<br>seitlichen Schienen, 5/4''<br>= 3,4 CM. hoher, innen<br>noch etwas mehr er- | Am 3. Tage Collaps,<br>Ausbruch eines kalten,<br>klebrigen Schweisses,<br>keiner unzählbarer,<br>flatternder Puls; nach<br>einem Glase Glühwein<br>erholte sich Patient<br>wieder. Am 4. Tage<br>grosse Mattigkeit, sehr<br>kleiner Puls, Abends<br>völliger Collaps m. sehr<br>rasch folgendem Tode.<br>D. Sektion ergab haupt-<br>sächlich: Leber stark<br>fettig degenerirt, Milz<br>auf das vierfache ver-<br>grössert, sehr matsch,<br>trübe Schwellung der<br>Nierensubstanz, fettige<br>Entartung der Epithe-<br>lien der Harnkanälchen.<br>Reaktion ziemlich be-<br>deutend, am 4. Tage ein<br>Theil der Nähte entfernt,<br>die letzten am 7. Tage.<br>Am 12. Tage Wechsel des<br>Verbandes, weil die<br>Hacke etwas hoch stand,<br>zugleich zur Verbesse-<br>rung der Fussstellung.<br>Am Ende des 1. Monats<br>Entstehung eines kleinen<br>Abscesses an der Innen-<br>seite, Incision. Am 37.<br>Tage ist die äussere<br>Wunde geschlossen, da- |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr. | Namen des Chirurgen und Jahr der Operation. | Namen der Operirten, Ursache, Dauer, Constitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgang. | Funktionelles Resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | <p>eiterung d. Fussgelenks mit vielfacher Ausstossung v. Knochenstücken, Heilung inschlechter Stellung des Fusses. das untere Bruchstück d. Tibia lag aussen nebst dem oberen und war gleichzeitig um etwa 90° nach innen rotirt, so dass d. Fusspitze ganz nach innen stand u. das Glied zum Gehen absolut unbrauchbar war; natürlich Ankylose des Gelenks, die ganze Umgebung von breiten Narben bedeckt. Verkürzung <math>\frac{3}{4}'' = 3,4</math></p> | <p>= 1,4 CM. resceirt Die Talustfläche mit dem Meissel geglättet. D. Narben verhinderten die richtige Stellung d. Fusses im Gypsverbnd., weshalb d. Verbesserung d. Stellung f. 1 Verbandwechsel aufgespart wurde. Zur Erleichterung der künftigen Bedeckung m. Haut wurde seitlich v. der Tibia, die bedeutend verdickt war, der Länge nach ein ziemlich grosses Stück abgesägt. Aussen die Wunde theilweise genäht. Gypsverband m.</p> |          | <p>höhter, Sohle u. einem Gummiringe an der Hacke, durch welchen ein Riemen einen elastischen Zug nach hinten und oben ausübt. Patient kann bald damit gehen, Anfangs m. Krücken, schliesslich im Zimmer wenigstens schon mit nur einem Stocke. Verkürzung <math>1\frac{3}{4}'' = 4,7</math> CM., von denen aber nur <math>\frac{1}{2}'' = 1,4</math> CM. auf die Resektion kommt. Seitlich war der Fuss absolut fest und unbeweglich. Das Resultat also bei diesen ungewöhnlich ungünstigen Verhältnissen ein über alle Erwartung befriedigendes. 17. Juni 72 Patient kann mit seinem Schienestiefel und 2 St. fort, ziemlich gut</p> | <p>gegen klagt Patient über Schmerzen an d. innern, dieselbe hat ein etwas diptherisches Aussehen, die Weichtheile sind aus dem Verband herausgequollen. Am 38. Tage wurde beim Verbandwechsel ein 4'' langes Stück, nekrotischer, aufgelockerter, verdickter u. mit Eiter imprägnirter Sehne von der hintern Seite d. Unterschenkels, wahrscheinlich von der Achillessehne entstammend, herausgezogen, d. Wundöffnung m. einer Carbolsäurelösung sorgfältig ausgespritzt. Fieber noch immer ziemlich hoch, der Eiter fliesst noch nicht in gewünschter Weise ab, Elevation d. Fusses beibehalten. Drainage. Am 45. Tage neuer Verband</p> |

d. Haut geöffnet, 63. Tag Verband entfernt.

fühls nicht so sehr geschont hätte. Neigung zur Vallgusstellung, Beweglichk. befried., Mal. ähnliche Neubildungen sind entstand., Umfang beider Füße in d. Mall. gegen 2,4 CM.

Bedeutende Reaktion  
4. Februar vereiterte Igmaldrüsen, Allgemeinbefinden schlecht, sehr empfindlich b. Bewegung.

14. Februar profuse Diarrhöen, Bronchialcatarrh. 16. Februar mehrere Male starkes Erbrechen, die Haut ist mit kaltem Schweiss bedeckt, die Axillardrüsen sind stark gedrisen. 18. Febr. Schüttelfrost, d. Wunde ist diptheritisch, die Ränder sind ödematös, blauroth, der Knochen trocken, Cauterisation mit Arg. nitr. 21 Febr. Allgemeinbefinden besser, Granulationen rosiger, unter dem Aetz schorft durchscheinend, intercurirende Schüttelfröste bis am 28. der Tod unter allen Erscheinungen der Pyaemie eintrat.

Tod.

Am 2. Tage nach seiner Aufnahme subperiostale Resektion der Tibia und Fibula  $1\frac{1}{2}'' = 4$  CM., Talus nicht. 27. Januar 72.

Hefiger Stoss um Weihnachten 1871 gegen den Malleol. extern. so dass er nicht aufstehen konnte Anschwellung d. Fussgels. unter lebhaft. Schmerz und Röthung. (Cataplasmen) Anbruch d. Gelenks, totale Vereiterung, Blossliegung d. Malleol. extern in der Ausdehnung v.  $1\frac{1}{2}'' = 4$  CM.

Albert Vollhardt  
8 Jahre  
aus Boraun bei Weissenfels.

Volkman  
1872.

Dass wir aus der uns zu Gebote stehenden Literatur nicht alle Fälle benutzt haben, scheint uns noch einiger erläuternder Worte zu bedürfen.

Natürlich ist es selbstverständlich, dass wir bei der Wahl der Fälle für diese Arbeit nicht willkürlich zu Werke gegangen sind, sondern vollständig objectiv die Sache behandelt haben. Wenn nun aber selbst die erste Veröffentlichung einschlagender Fälle zuweilen mangelhaft genug ist, so kommt es dann schliesslich oft dahin, dass dieselben in Auszügen derartig zusammenschrumpfen, dass sie zuletzt für eine statistische Arbeit, welche ja alle Gesichtspunkte einer Operation beleuchten soll, ganz unbrauchbar werden. Nicht immer aber stehen dem Einzelnen alle einschlagenden Werke und Abhandlungen zu Gebote, so dass er dann doch etwas Ganzes liefern könnte. Daher haben wir die Fälle, welche uns weder für den einen noch für den anderen Punkt brauchbar erschienen, gar nicht mit aufgenommen.

In dem Folgenden nun haben wir versucht, unser zusammengebrachtes Material nach den verschiedenen Richtungen hin zu verarbeiten und sind dabei so verfahren, dass wir dasselbe zuerst nach der die Operation veranlassenden Ursache und zuletzt nach der jetzt gewöhnlichen Eintheilung in totale und partielle Fussgelenkresektionen zusammengestellt haben. Bei den ersten 96 Fällen wurde letztere Eintheilung in den Tabellen neben der Eintheilung nach der die Operation veranlassenden Ursache streng durchgeführt, während die 8 von Herrn Professor R. Volkmann ausgeführten Resektionen, welche nur ungefähr ein Drittel der von Demselben gemachten Operationen repräsentiren, chronologisch geordnet sind.

Beginnen wir mit den wegen Caries ausgeführten Resektionen, welche numerisch überwiegen.

Von 27 totalen Resektionen fanden wir 20 = 74 pCt. mit Erhaltung des Lebens, wenn wir 4 Misserfolge und zwei Heilungen mit Fisteln mitrechnen, 14 = 52 pCt. Heilungen, während auf diese 7 = 26 pCt. Todesfälle kommen.

Die Heilung trat im Durchschnitt ein nach 165 Tagen (zwischen 60 und 330 Tagen äusserste Termine), der Tod

nach 170 Tagen (zwischen 10 und 480 äusserste Termine). Es wurden von 11 Fällen mit beweglichem Gelenke geheilt  $7 = 63$  pCt., mit Ankylose  $4 = 37$  pCt.

Die 6 partiellen Resektionen ergaben  $3 = 50$  pCt. Heilungen und ebensoviel Todesfälle. Heilungsdauer durchschnittlich 94 Tage, der Tod trat am 60. Tage ein.

Nehmen wir alle zusammen, so kommen auf 33 Fälle quoad vitam  $23 = 70$  pCt., während Heilungen  $17 = 51,5$  pCt. und Todesfälle  $10 = 30,3$  pCt. sich ergeben.

Heilungsdauer 128 Tage.

Todeseintritt am 115. Tage.

Wegen Traumen, mit Abzug der wegen Schussverletzungen, ergeben 11 totale Resektionen quoad vitam  $81,7$  pCt.  $= 9$  Fälle, wenn wir 1, der mit Fisteln geheilt ist, mitzählen, Heilungen  $72,7$  pCt.  $= 8$ ; Todesfälle  $18$  pCt.  $= 2$ . Die Heilung dauerte im Durchschnitt 186 Tage (zwischen 75 und 480 äusserste Termine); der Tod trat am 18. Tage durchschnittlich ein. Mit beweglichem Gelenk wurden  $5 = 83,3$  pCt. geheilt, mit Ankylose  $1 = 16,7$  pCt.

Die 19 partiellen ergaben quoad vitam  $14 = 73,6$  pCt., wenn 2 Misserfolge mitgezählt werden, sonst  $12 = 63$  pCt. Heilungen und  $5 = 26,3$  pCt. Todesfälle.

Die Heilung dauerte durchschnittlich 138 Tage (60 und 300 als äusserste Termine).

Der Tod trat im Durchschnitt am 10. Tage ein.

Die totalen und partiellen zusammengenommen ergeben das Resultat von 30 Fällen quoad vitam  $23 = 76,6$  pCt., Heilungen  $20 = 66,6$  pCt., Todesfälle  $7 = 23$  pCt.

Im Durchschnitt trat die Heilung nach 162 Tagen, der Tod nach 14 Tagen ein.

Wegen Schussverletzungen kommen auf 13 totale Resektionen  $10 = 77$  pCt. Heilungen und  $3 = 23$  pCt. Todesfälle.

Die Heilung trat im Durchschnitt am 132. Tage ein (zwischen 81 und 360 als äusserste Termine), der Tod am

21. Tage. 10 von den 13 Fällen waren sekundäre Resektionen und subperiostal davon 8 = 80 pCt. Heilungen.

Ein bewegliches Gelenk wurde aber in 6 Fällen nur 2 Mal (33,3 pCt.) erzielt, hingegen 4 Mal (66,6 pCt.) Ankylose.

Unter 10 partiellen quoad vitam 7 = 70 pCt.; Heilungen 6 = 60 pCt., Todesfälle 3 = 30 pCt.

Die Heilung trat im Durchschnitt am 128. Tage, der Tod am 50. Tage ein.

9 Fälle waren sekundär davon, 6 = 66,6 pCt. Heilungen.

Also zusammen 23 Fälle, quoad vitam 17 = 74 pCt. Heilungen 16 = 69,5 pCt., Todesfälle 6 = 26 pCt.

Die Heilung trat im Durchschnitt am 130. Tage, der Tod am 35. Tage ein.

Von 19 sekundären Resektionen 14 = 74,6 pCt. Heilungen.

7 Total-Resektionen wegen acuter Gelenkvereiterung wurden geheilt im Durchschnitt am 205. Tage (60 und 540 äusserste Termine), 540 s. 99.

2 Partiell-Resektionen verliefen lethal im Durchschnitt am 18. Tage.

4 Total-Resektionen wegen Ankylose mit Heilung, bei welchen 3 Mal ein bewegliches Gelenk, 1 Mal wieder Ankylose erzielt wurde. Heilung durchschnittlich am 147. Tage.

Eine Gegenüberstellung der erhaltenen Resultate würde jedenfalls ganz passend sein. jedoch abstrahiren wir davon, da die Uebersicht der einzelnen Punkte eine leichte ist, und da wir ferner eine zu umfangreiche Arbeit dem Zwecke gar nicht entsprechend erachten, aus diesen beiden Gründen begnügen wir uns mit der Angabe der gefundenen Resultate. Nachdem wir so die uns gestellte Aufgabe nach einer Richtung hin gelöst, erübrigt uns noch, die Fälle nach der Eintheilung in totale und partielle zusammenzustellen.

65 Total-Resektionen ergeben quoad vitam 53 = 81,5 pCt., Heilungen 49 = 75 pCt., wenn wir die drei mit Fisteln geheilten Fälle mit dazu rechnen, ohne diese 46 =

70,7 pCt. Heilungen; 12 = 18,4 pCt. Todesfälle, 4 = 6,1 pCt. Misserfolge.

Die Heilung dauerte durchschnittlich 167 Tage.

Der Tod trat im Mittel am 69. Tage ein.

Was die Verkürzung anbetrifft, so kommt auf 3 Cm. resecirten Knochen 1 Cm. Verkürzung.

In 33 Fällen wurde bei 21 = 63,6 pCt. ein bewegliches Gelenk, bei 12 = 36,4 pCt. Ankylose erzielt.

Bei 14 sekundären Resektionen trat 11 Mal = 78 pCt. Heilung ein.

Bei 21 subperiostal vollführten Operationen haben wir 17 = 81 pCt. Heilungen zu verzeichnen, 3 = 14,3 pCt. Todesfälle, 1 = 4,7 pCt. Misserfolg.

Auf die verschiedenen Altersstufen waren die Resektionen wie folgt vertheilt:

| Alter | Heilung | Tod | Misserfolg | Summe |
|-------|---------|-----|------------|-------|
| 1—10  | 2       | —   | 1          | 3     |
| 10—20 | 4       | 2   | 1          | 7     |
| 20—30 | 14      | 4   | 2          | 20    |
| 30—40 | 8       | 2   | —          | 10    |
| 40—50 | 7       | —   | —          | 7     |
| 50—60 | 1       | 1   | —          | 2     |
| 60—70 | 1       | —   | —          | 1     |
| Summe | 37      | 9   | 4          | 50    |

Von den 4 Misserfolgen (2, 11, 21, 22) wurden 2 amittirt (11, 22).

Die Partiell-Resektionen wollen wir, je nachdem beide oder ein Unterschenkelknochen resecirt wurden, besonders betrachten.

Von den ersteren haben wir unter 23 Fällen 12 = 52,1 pCt. Heilungen, 10 = 43,4 pCt. Todesfälle 1 = 4,3 Misserfolg, quoad vitam 13 = 56,5 pCt.

Die Heilung dauerte im Mittel 145 Tage, der Tod trat im Durchschnitt am 20. Tage ein.

Auf 3 Cm. resecirten Knochen kam 1 Cm. Verkürzung. In den 8 angegebenen Fällen wurde bei 5 = 62,5 pCt.

ein bewegliches Gelenk, in 3 = 37,5 pCt. Ankylose erzielt.

Bei 8 subperiostalen Resektionen 5 = 62,5 pCt. Heilungen, 3 = 37,5 pCt. Todesfälle.

Bei 8 sekundären Resektionen 50 pCt. Heilungen.

Von 3 primären 2 = 66,6 pCt. Heilungen, 1 = 33,3 pCt. Todesfall.

Auf die verschiedenen Alter vertheilen sie sich wie folgt:

| Jahre | Heilung | Tod | Misserfolg | Summe |
|-------|---------|-----|------------|-------|
| 1—10  | —       | 1   | —          | 1     |
| 10—20 | 3       | —   | —          | 3     |
| 20—30 | 1       | 2   | 1          | 4     |
| 40—50 | 1       | —   | —          | 1     |
| 50—60 | —       | 3   | —          | 3     |
| Summe | 5       | 6   | 1          | 12    |

Der 1. Fall Misserfolg (71) wurde amputirt.

Von den letzteren, also die mit Resektion eines Knochens, kamen auf 16 Fälle 10 = 62,5 pCt. Heilungen, 4 = 25 pCt. Todesfälle, 2 = 12,5 pCt. Misserfolge, quoad vitam 12 = 75 pCt.

Die Heilung dauerte durchschnittlich 102 Tage, der Tod trat im Mittel am 36. Tage ein.

Auf 3,2 Cm. kam 1 Cm. Verkürzung.

Bei den 7 angegebenen Fällen wurde 6 Mal ein bewegliches Gelenk (85,7 pCt.) und ein Mal Ankylose (14,3 pCt.) erzielt.

Auf 3 subperiostale Resektionen kommen 2 = 66,6 pCt. Heilungen, 1 = 33,3 pCt. Todesfall.

Auf 4 sekundäre Resektionen 3 = 75 pCt. Heilungen, 1 = 25 pCt. Todesfall.

Auf 3 primäre Resektionen kommen 2 = 66,6 Heilungen, 1 = 33,3 Todesfall.

Auf die verschiedenen Alter vertheilen sich die Fälle wie folgt:

| Jahre | Heilung | Tod | Misserfolg | Summe |
|-------|---------|-----|------------|-------|
| 10—20 | 2       | 1   | —          | 3     |
| 20—30 | 2       | —   | 1          | 3     |
| 40—50 | 2       | 1   | —          | 3     |
| 50—60 | —       | 1   | —          | 1     |
| 60—70 | 1       | 1   | —          | 2     |
| Summe | 7       | 4   | 1          | 12    |

Um nun eine Total-Uebersicht zu gewinnen, stellen wir die totalen Resektionen und beide Unterabtheilungen der partiellen zusammen.

Die Resultate in den 104 gesammelten Fällen sind quoad vitam 78 = 75 pCt., Heilungen 68 = 65,4 pCt., Todesfälle 26 = 25 pCt., Misserfolge 7 = 6,7 pCt.

Die Heilung dauerte durchschnittlich 138 Tage (60 und 540 äusserste Termine); der Tod trat im Mittel am 42. Tage ein (4 und 480 äusserste Termine).

Auf 3,1 Cm. resecirten Knochen kommt im Mittel 1 Cm. Verkürzung. (Nr. 26 auf 20,3 Cm. nur 4 Cm. und Nr. 50 auf 10,8 Cm. keine Verkürzung.)

Bei 48 angegebenen Fällen wurde 32 Mal = 66,6 pCt. ein bewegliches Gelenk erzielt und 16 Mal = 33,3 pCt. Ankylose.

Von 32 subperiostalen Resektionen haben wir 24 = 75 pCt. Heilungen.

Von 26 sekundären Resektionen 18 = 69,2 pCt. Heilungen.

Von 6 primären 4 = 66,6 pCt. Heilungen.

Auf die verschiedenen Alter vertheilen sich die Fälle wie folgt:

| Jahre | Heilung | Tod | Misserfolg | Summe |
|-------|---------|-----|------------|-------|
| 1—10  | 2       | 1   | 1          | 4     |
| 10—20 | 9       | 3   | 1          | 13    |
| 20—30 | 17      | 6   | 4          | 27    |
| 30—40 | 8       | 2   | —          | 10    |
| 40—50 | 10      | 1   | —          | 11    |
| 50—60 | 1       | 5   | —          | 6     |
| 60—70 | 2       | 1   | —          | 3     |
| Summe | 49      | 19  | 6          | 74    |

Von den 10 Misserfolgen wurden 3 (11, 22, 71) mit Erfolg amputirt, während in 5 Fällen (4, 9, 70, 78, 102) auch die Amputation die Patienten vom Tode nicht retten konnte.

In zwei Fällen (6, 87) wurde die Achillessehne durchschnitten und doch ein bewegliches Gelenk erzielt.

Es wurde 1 Mal ein vorderer Lappenschnitt gemacht mit Durchschneidung der Sehnen der Extensoren und der Art. dors. ped. und auch ein bewegliches Gelenk erzielt (23).


Accidentelle Krankheiten, welche mehr oder weniger den Heilungsprocess verzögerten, wurden folgende beobachtet:

- 7 Mal Abscesse (7, 21, 24, 54, 75, 98, 103).
- 3 - Erysipel (16, 58, 75).
- 3 - Necrosen (12, 20, 58).
- 2 - Eitersenkung (16, 76).
- 1 - Diphtheritis (81).
- 1 - Sehnenscheidenentzündung (82).
- 1 - Fersendekubitus (76).
- 1 - Tetanus (10).
- 1 - Delirium (10).
- 1 - Hospitalbrand (57).
- 1 - Periostitis (58).
- 1 - Sehnennekrose (103).
- 1 - Parese d. ob. Extremität (79).

Die Todesursachen waren folgende:

- 7 Mal Pyaemie (4, 35, 47, 60, 70, 78, 104).
- 7 - Erschöpfung (9, 13, 15, 80, 83, 85, 102).
- 3 - Tuberculose (5, 17, 65).
- 2 - Pneumonie (64, 84).
- 2 - Schädelkontusion resp. Fraktur (36, 69).
- 1 - Gangraen (44).
- 1 - Gangraen nosocomialis (74).
- 1 - Erysipel (95).

Hier betrachten wir die uns für jetzt gestellte Aufgabe als gelöst und schliessen, indem wir dem hochverehrten Herrn Professor R. Volkmann für seine warme Theilnahme und freundlichen Rathschläge unsern aufrichtigsten und innigsten Dank sagen.



## Lebenslauf.

Den 19. Mai 1848 wurde ich, Laurenz Joseph Emanuel Lauffs von katholischen Eltern, welche mir Gott noch lange erhalten möge, in der alten Kaiserstadt Aachen geboren; daselbst erhielt ich auch meine Gymnasialbildung. Herbst 1867 ging ich, ausgerüstet mit dem Maturitätszeugniss nach Bonn, um mich dem Studium der Medicin zu widmen. Nachdem ich dort am Schlusse des 4. Semesters das Tentamen physicum gemacht hatte, begab ich mich nach Würzburg, von wo mich der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges zurückrief. Während desselben diente ich als stellvertretender Assistenzarzt, theilweise bei dem Reserve-Lazareth Aachen, theilweise bei der Ersatz-Escadron Rhein. Kürassier-Regiments Nr. 8 zu Deutz, dem Vaterlande. Nach Beendigung meiner Dienstzeit nahm ich die unterbrochenen Studien wieder auf und zog Herbst 1871 nach Halle a. d. S., um meine academischen Studien zu beenden. Am 2. und 3. August bestand ich das Tentamen medicum und Examen rigorosum.

Meine Lehrer während der Zeit waren die Herren Professoren und Docenten:

In Bonn: Doutrelepont, Hanstein, Kekulé, Pflueger, Plücker, Schafhausen, M. Schultze, de la Valette St. George, Weber, Wüllner, Preyer.

In Würzburg: v. Bamberger, Dehler, Geigel, v. Linhart,  
v. Recklinghausen, Rinecker, v. Scanzoni, v. Troeltsch,  
Koester, Müller, Rossbach.

In Halle: Graefe, Olshausen, Vogel, Volkmann, Weber,  
Kohlschütter, Steudener.

Allen diesen Herren meinen besten Dank.

## Thesen.

- 1) Bei schlecht verlaufenden Fussgelenkresektionen ist die Amputation des Unterschenkels frühzeitig vorzunehmen.
  - 2) Bei Glottisödem soll in Erstickungsgefahr unverzüglich zur Laryngotomie geschritten werden.
  - 3) Die Expressionsmethode des kindlichen Kopfes in der Wehenpause ist der beste Dammschutz.
  - 4) Bei der Differential-Diagnose intraoculärer Geschwülste ist das Alter des Patienten einer der Hauptfactoren.
  - 5) Euthanasie ist in manchen Fällen die wichtigste Indication für die Therapie.
-